

# Nationella folkhälsoenkäten 2010 – Nationella resultat

## Läkemedel

Här redovisas sammanfattade resultat för området läkemedel. I presentationen ingår 10 067 personer, 46 procent män och 55 procent kvinnor, från det nationella urvalet. Resultaten i sin helhet redovisas i Excel filer uppdelat efter kön, ålder, utbildning, sysselsättning, socioekonomi, ekonomisk situation samt födelseland. Resultaten var beräknade på det nationella urvalet där nationella resultat redovisas årsvis.

### Allergimedien

Andelen som angav att de åt allergimedien var relativt stabil över tid (kvinnor 16 procent och män 12 procent), det var dock något vanligare bland kvinnor. Det var heller ingen skillnad mellan åldersgrupper eller utbildning. Däremot var det vanligare bland kvinnor med sjukpenning/ersättning och bland kvinnor med en utsatt ekonomisk situation.

### Antidepressivmedien

Det var vanligare bland kvinnor än män (kvinnor 9 procent och män 5 procent) att äta antidepressiv medicin men andelen var stabil över tid, det var dock något vanligare bland äldre kvinnor och män (45 år och äldre). Det var något mindre vanligt bland kvinnor med lång utbildning samt bland dem som yrkesarbetade. Däremot var det vanligare bland dem i arbetaryrken och bland dem med en utsatt ekonomisk situation.

### Blodfettssänkande medicin

Det var vanligare bland män än bland kvinnor (kvinnor 9 procent och män 12 procent) att äta blodfettssänkande medicin, andelen var stabil över tid bland män. Men bland kvinnor hade det skett en ökning sedan 2004 med 2 procentenheter av andelen som äter blodfettssänkande medicin. Det var ovanligt bland yngre kvinnor och män, 16-44 år. Det var något mindre vanligt bland kvinnor med lång utbildning jämfört med kort utbildning. Däremot var det vanligare bland dem som hade sjukpenning/ersättning.

### Blodtryckssänkande medicin

Det var ingen skillnad i andelen män och kvinnor (kvinnor 18 procent och män 19 procent) som använde blodtryckssänkande medicin, andelen var stabil över tid bland män. Bland kvinnor hade det skett en ökning sedan 2004 med 2 procentenheter. Det var ovanligt bland yngre kvinnor och män, 16-44 år. Det var något mindre vanligt bland dem med lång utbildning jämfört med kort. Däremot var det vanligare bland dem som hade sjukpenning/ersättning.

### Diabetesmedien

Det var en liten andel som använde diabetes medicin, det var vanligare bland män (6 procent) än bland kvinnor (4 procent) att äta diabetes medicin, andelen var stabil över tid. Det var ovanligt bland yngre kvinnor och män, 16-44 år. Det var något mindre vanligt bland kvinnor med lång utbildning och bland dem med hög inkomst. Däremot var det vanligare bland dem som hade sjukpenning/ersättning.

## **Lugnande medicin**

Det var vanligare bland kvinnor än bland män (kvinnor 8 procent och män 5 procent) att äta lugnande medicin, andelen var stabil över tid. Det var vanligare bland äldre kvinnor, 65 år och äldre, bland män var det vanligare i åldern 45 år och äldre. Det var vanligare bland både kvinnor och män med kort utbildning och bland dem som var arbetslösa eller hade sjukpenning/ersättning jämfört med dem som yrkesarbetade. Det var även vanligare bland dem som var ekonomiskt utsatta. Det var mindre vanligt bland tjänstemän på mellan eller högre nivå.

## **Magsårs/magkatarrs medicin**

Det var vanligare bland kvinnor (16 procent) än bland män (11 procent) att äta magsårs/magkatarrs medicin, andelen var stabil över tid. Det var vanligare bland dem i åldersgruppen 45 år och äldre. Det var vanligare bland både kvinnor och män som hade sjukpenning/ersättning jämfört med dem som yrkesarbetade och bland kvinnor som var ekonomiskt utsatta. Det var mindre vanligt bland dem med lång utbildning.

## **Receptbelagd värkmedicin**

Det var vanligare bland kvinnor (19 procent) än bland män (13 procent) att ta receptbelagd värkmedicin, andelen var stabil över tid. Andelen ökar med ålder. Det var vanligare bland både kvinnor och män med kort utbildning och bland kvinnor i arbetaryrken samt bland dem som var ekonomiskt utsatta och bland dem födda utanför Norden. Det var det mindre vanligt bland yrkesarbetande samt bland dem med lång utbildning.

## **Receptfri värkmedicin**

Det var en stor andel kvinnor (57 procent) och män (41 procent) som tog receptfri värkmedicin, andelen var stabil över tid men det var vanligare bland kvinnor. Det var mindre vanligt bland dem i åldersgruppen 65 år och äldre samt bland kvinnor med lång utbildning jämfört med motsvarande grupper. Det var vanligare bland både kvinnor och män som var födda utanför Europa jämfört med dem som var födda i Sverige.

## **Sömnmedel/insomningsmedicin**

Andelen kvinnor som tog sömnmedel eller insomningsmedicin var 13 procent, vilket var vanligare än bland män (8 procent), andelen var stabil över tid för både män och kvinnor. Det var vanligare bland kvinnor i åldersgruppen 45 år och äldre jämfört med yngre, bland män var det vanligare i åldrarna 30 år och äldre. Det var även vanligare bland dem med en utsatt ekonomisk situation. Det var något mindre vanligt bland kvinnor med lång utbildning jämfört med dem med kortare utbildning samt bland dem som var yrkesarbetande.

## **Avstått medicin**

Av dem som avstått från att köpa medicin (kvinnor 8 procent och män 7 procent), så avstod de flesta för att de redan hade nog med medicin (23 procent), det var ingen skillnad mellan män och kvinnor. För män var den näst största anledningen att man blivit frisk och sedan att man inte hade råd, för kvinnor var det ingen skillnad mellan dessa två skäl. Det var även en stor andel som angav att de inte hade någon tro på medicin, här var det ingen skillnad mellan kvinnor och män. Annan orsak än de som var angivna i enkäten angavs av 26 procent av kvinnorna och 20 procent av männen.