

Nationella folkhälsoenkäten 2010 – Nationella resultat

Vårdkontakter

Här redovisas sammanfattade resultat för området funktionsnedsättning. I undersökningen ingår 10 067 personer, 46 procent män och 55 procent kvinnor, från det nationella urvalet. Resultaten i sin helhet redovisas i excelfiler uppdelat efter kön, ålder, utbildning, sysselsättning, socioekonomi, ekonomisk situation samt födelse-land. Resultaten är beräknade på det nationella urvalet där nationella resultat redovisas årsvis.

Kontakt med sjukvården

2010 uppgav 43 procent av de svarande männen och 53 av kvinnorna att de hade sökt kontakt med sjukvården för egna besvär under de senaste tre månaderna. År 2004 och 2007 var det lägre andel som haft kontakt med vården jämfört med övriga år. Det var betydligt vanligare att ha haft kontakt för de som är 45-84 år jämfört med 16-44, både män o kvinnor. Inga skillnader mellan utbildningsnivå. Det var även vanligare bland dem som var arbetslösa eller hade sjukpenning/ersättning samt för dem som hade en ekonomiskt utsatt situation. Kvinnor födda utanför Europa hade i större utsträckning haft kontakt med sjukvården jämfört med Svenskfödda.

Varit inlagd på sjukhus

År 2010 var det 5 procent av de svarande uppgav att de hade varit inlagda på sjukhus de senaste tre månaderna – inga skillnader mellan kvinnor och män. Bland både kvinnor och män betydligt vanligare att ha varit inlagd bland åldersgruppen 65-84 jämfört med de yngre åldrarna. Det var även vanligare bland dem med sjukpenning/ersättning liksom bland personer med en ekonomiskt utsatt situation. Bland personer födda utanför Europa angav 9 procent att de legat på sjukhus, att jämföra med 4 procent bland dem från Sverige.

Besökt läkare på vårdcentral

Inga skillnader över tid mellan år. Ju äldre man är desto större andel hade besökt läkare på vårdcentral – 24 procent för 16-24 år jämfört med 48 procent för de 65-84 år. De med kort utbildning besökte Vårdcentraler i större utsträckning än de med lång utbildning. Det var vanligare bland dem med sjukpenning/ersättning, bland arbetslösa än bland yrkesarbetande och bland dem i en ekonomiskt utsatt situation. De födda utanför Europa uppsökte vårdcentral i större utsträckning än de födda i Sverige – 43 respektive 34 procent.

Besökt läkare på sjukhus

År 2010 uppgav 21 procent att de hade uppsökt läkare på sjukhus de senaste tre månaderna och där var inga skillnader mellan kvinnor och män och heller inga skillnader jämfört med tidigare år. Det är betydligt vanligare bland äldre, 65 år och äldre samt bland män med kort utbildning. Personer som uppbär sjukpenning/ersättning besökte läkare på sjukhus betydligt oftare än yrkesarbetande. För män var det dessutom en skillnad mellan de som yrkesarbetade och de som var arbetslösa – 14 respektive 24 procent. Det är genomgående de med en utsatt ekonomisk situation som i större utsträckning uppsöker läkare på sjukhus jämfört med de som inte har samma utsatta ekonomiska situation. Personer födda utanför Norden uppsöker läkare på sjukhus i större utsträckning än de födda i Sverige och övriga Norden.

Besökt distriktssköterska

Inga skillnader för de senaste sex åren och heller inga skillnader mellan kvinnor och män. Det är framförallt personer 65-84 som har besökt, bland män var det vanligare bland dem med kort utbildning jämfört med de med lång utbildning, det var även vanligare bland arbetslösa män att i högre utsträckning ha besökt distriktssköterska jämfört med yrkesarbetande. Personer som hade en utsatt ekonomisk situation besökte distriktssköterska i större utsträckning jämfört med de som inte var i samma utsatta situation. Det var även vanligare bland personer födda utanför Norden jämfört med de födda i Sverige – 18 respektive 12 procent.

Besökt kurator

Det finns inga skillnader över tid mellan år när det gäller de som besökt kurator de senaste tremånaderna. Däremot är det en skillnad mellan kön – 2010 uppgav 4 procent av kvinnorna och 2 procent av männen att de hade uppsökt kurator. Det var vanligare bland de i åldersgruppen 16-29 år och minst vanligt förekommande bland de över 65 år, 5 respektive 1 procent. Personer med sjukpenning/ersättning var den grupp som i störst utsträckning uppsökte kurator, 22 procent, medan det inte var några skillnader mellan kvinnor och män som var yrkesarbetande, arbetslösa eller studerande.

Besökt psykolog

Inga skillnader över tid att ha besökt psykolog, däremot var genomgående vanligare bland kvinnor jämfört med män. Personer över 65 år besökte psykolog i mindre utsträckning än de yngre åldersgrupperna. Bland dem som hade sjukpenning/ersättning var det vanligare att uppsöka psykolog jämfört med de yrkesarbetande och arbetslösa. Värt att notera är att så många som 26 procent av de studerande/praktiserande kvinnor som besvarat enkäten uppgav att de uppsökt psykolog, att jämföra med 6 procent av motsvarande grupp män. Det var även vanligare bland dem med en utsatt ekonomisk situation.

Besökt sjukgymnast

Det finns inga skillnader över tid när det gäller besök hos sjukgymnast, men däremot är det genomgående över tid vanligare att kvinnor går till sjukgymnast än män – 11 respektive 8 procent. Det var vanligare bland dem i åldersgruppen 45 år och äldre jämfört med yngre åldersgrupper. För kvinnor var det också mer vanligt förekommande att de med kort utbildning gick till sjukgymnast jämfört med de med lång utbildning. Det var även vanligare bland dem med sjukpenning/ersättning att ha uppsökt sjukgymnast. För kvinnor var det också en relativt hög andel arbetslösa som uppsökte sjukgymnast – 14 procent jämfört med 6 procent av de arbetslösa männen. Det var även vanligare för kvinnor med utsatt ekonomisk situation att i högre grad ha uppsökt sjukgymnast medan det för män inte fanns några skillnader mellan grupperna. För kvinnor var det vanligare att de födda utanför Norden och utanför Europa uppsökte sjukgymnast jämfört med kvinnor födda i Sverige respektive övriga Norden.

Besökt naprapat, kiropraktiker, homeopat och dyl.

Inga skillnader mellan år och inte heller mellan kön, år 2010 uppsökte 8 procent av kvinnorna och 7 procent av männen naprapat, kiropraktiker, homeopat el dyl.. Det var vanligare bland dem i åldrarna 30-64 år jämfört med de yngre och äldre åldersgrupperna. Det var vanligast bland dem med mellanlång utbildning jämfört med dem med kort respektive lång utbildning. För kvinnor var det vanligare bland tjänstemän än bland arbetare. Det var också mindre vanligt bland kvinnor födda i Norden utanför Sverige än kvinnor födda i Sverige. För män var det vanligare att bland dem med hög inkomst.

Avstått att söka vård

År 2010 avstod 18 procent av kvinnorna och 15 procent av männen att söka vård. Det var vanligare bland dem i åldersgruppen 16-29 år att ha avstått år jämfört med dem i äldre åldersgrupper. Det var även en stor andel av dem med sjukpenning/ersättning som avstått från att söka vård jämfört med de som yrkesarbetade (41 procent bland kvinnorna och 27 procent bland männen). Tjänstemän på mellan eller högre nivå hade i mindre utsträckning avstått jämfört med de i arbetaryrken. Det var vanligare bland dem i en utsatt ekonomisk situation att ha avstått samt bland dem födda utanför Europa.

Av kvinnorna var 16 procent som angav att besvären gått över som skäl till varför de avstått, 14 procent angav långa väntetider, 12 procent angav att de inte fått telefonkontakt inom en rimlig tidsram, 7 procent angav att de inte fått en besökstid snabbt nog. Den största andelen, 30 procent, angav negativa erfarenheter som skäl, 14 procent angav ekonomiska skäl, 22 procent hade inte tid och 12 procent visste inte var de skulle vända sig. Hela 26 procent angav att det var av en annans orsak än de listade.

För män var det 18 procent som angav att besvären gått över som skäl till varför de avstått, 14 procent angav långa väntetider, 12 procent angav att de inte fått telefonkontakt inom en rimlig tidsram, 9 procent angav att de inte fått en besökstid snabbt nog. En stor andel, 26 procent, angav negativa erfarenheter som skäl, 16 procent ekonomiska skäl, 26 procent hade inte tid och 11 procent visste inte var de skulle vända sig. Hela 23 procent angav att det var av en annans orsak än de om var listade.