

Vad betyder bortfallet för resultatet i folkhälsoenkäter?

Gunnel Boström

Sammanfattning

Då bortfallet i folkhälsoenkäter ökar för varje år är det viktigt att veta hur de som utgör det ökade bortfallet ser ut. Liknar bortfallet dem som svarat eller har de ett avvikande svarsmönster? Åren 2002-2003 gjordes bortfallsuppföljningar i Norrlandslänen, Göteborg med omnejd och i Stockholms län. Dessa bortfallsuppföljningar har här analyserats med avseende på hur bortfallet avviker från de svarande.

I det material som här studerats varierar andelen som nåtts av bortfallet betydligt från 7 till 27 procent. Även antalet personer som svarat i bortfallsuppföljningen varierar betydligt från 103 till 645 personer. Detta innebär att det måste vara betydande skillnader för att det ska påverka resultaten. En tänkbar orsak till att en så liten andel av bortfallet svarat på bortfallsuppföljningen kan vara att alldeles för många frågor ställts. Kanske hade det varit lättare att få bortfallet att delta i uppföljningen om frågorna varit färre och ansträngningarna att nå bortfallet varit större.

Bortfallsuppföljningarna har inte inneburit några statistiskt säkerställda förändringar i prevalenser trots avvikelser mellan bortfall och deltagare.

Bortfallet tycks inte ha ett avvikande socialt svarsmönster gentemot de som svarat på enkäten. Exempelvis är det vanligare att personer med kort utbildning röker mer än dem med lång utbildning både ibland deltagarna och i bortfallet.

De hjälpvariabler som använts för att skapa kalibreringsvikter tycks ha fungerat väl. Kravet på att dessa skulle samvariera med viktiga målvariabler i enkäten har säkert bidragit till att kalibreringen fungerat så bra.

Bortfallsuppföljningar bör göras regelbundet så vi kan få kunskap om huruvida bortfallet har ett avvikande socialt svarsmönster. Om svarsmönstret är lika för deltagare och bortfall kan kalibreringen kompensera för ett större bortfall. Det är viktigt att bortfallsuppföljningens främsta syfte verkligen är att få kunskap om bortfallet och inte att öka andelen svarande. Endast ett fåtal frågor bör noggrant väljas ut och ställas till bortfallet. Det är viktigt att så många som möjligt av bortfallet svarar. Det är bättre att koncentrera bortfallsuppföljningen till en liten del av urvalet och verkligen anstränga sig för att nå personerna i bortfallet. Bortfallsuppföljning bör planeras tillsammans med SCB. De registeruppgifter som SCB använder för att skapa kalibreringsvikter bör i samband med bortfallsuppföljningen kunna redovisas lite mer detaljerat än som är brukligt i tekniska rapporter.

Inledning

Folkhälsoenkäter har gjorts i landstingen sedan 1990-talet. År 2004 gjordes den första nationella folkhälsoenkäten i samarbete med Västra Götaland, Gävleborg, Halland, Kronoberg och Dalarna. Sedan år 2004 har den nationella folkhälsoenkäten gjorts varje år. Statens folkhälsoinstitut står för ett nationellt urval och de deltagande landstingen

gör tilläggsurval för sina respektive landsting. Ett stort bekymmer då man gör enkäter är det under senare år allt större bortfallet. Detta har uppmärksammats av Statistiska centralbyrån (SCB) som administrerar den nationella folkhälsoenkäten. SCB tar fram en speciell kalibreringsvikt (1) för varje deltagande person. Denna kalibreringsvikt ska både kompensera för bortfall och räknar upp resultaten till befolkningsnivå. I tabell 1 redovisas hur inflödet av enkäter sett ut åren 2004 till 2009.

Tabell 1. Beskrivning av inflödet i det nationella urvalet i Nationella folkhälsoenkäten, 2004-2009.

	2004 Antal (%)	2005 Antal (%)	2006 Antal (%)	2007 Antal (%)	2008 Antal (%)	2009 Antal (%)
Efter 1:a utskick	6 609 (33,0)	3 880 (38,8)	3 606 (36,2)	2 939 (29,5)	6 457 (32,4)	6 365 (32,0)
Efter ToP ¹	2 398 (12,0)	972 (9,7)	971 (9,7)	885 (8,9)	2 680 (13,4)	1 537 (7,7)
Efter påminnelse 1	2 046 (10,2)	667 (6,7)	933 (9,4)	775 (7,8)	1 506 (7,5)	1 668 (8,4)
Efter påminnelse 2	1 113 (5,6)	505 (5,1)	485 (4,9)	334 (3,3)	475 (2,4)	803 (7,0)
Efter påminnelse 3				239 (2,4)		
Webbsvar ²				566 (5,7)		
Svar totalt	12 166 (60,8)	6 024 (60,3)	5 995 (60,1)	5 738 (57,5)	11 118 (55,7)	10 373 (52,1)
Bortfall	7 838 (39,2)	3 965 (39,7)	3 973 (39,9)	4 233 (42,5)	8 839 (44,3)	9 545 (47,9)
Nettourval	20 004 (100)	9 989 (100)	9 968 (100)	9 971 (100)	19 957 (100)	19 918 (100)

Bortfallet har ökat varje år från 39,2 procent år 2004 till 47,9 år 2009. Den absolut största förändringen ägde rum år 2007 då bortfallet ökade med hela 5 procentenheter från 39,9 procent år 2006 till 44,9 procent. Då beslutades att ytterligare en påminnelse skulle skickas ut och ytterligare 2,4 procent svar kom in. År 2008, då ingen tredje påminnelse skickades ut, var bortfallet 44,3 procent och år 2009 hade bortfallet ökat till 47,9 procent.

Material

År 2002 gjordes en folkhälsoenkät i Stockholms län och år 2003 gjordes enkäter i Göteborg med omnejd och i Norrlandslänen. Samtliga som ansvarade för respektive enkät var med i den s.k. metodgruppen som var med och utvecklade den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. De tre enkäterna planerades först tillsammans men Stockholm gick sin egen väg och skickade ut sin enkät först. Göteborgsenkäten och Norrlandsenkäten utarbetades i samarbete och dessa enkäter är nästan exakt lika. Stockholm och Göteborg anlätade Statistiska centralbyrån (SCB) för att genomföra enkäterna och Norrlandslänen anlätade Infoscandic i Umeå.

Samtliga dessa tre enkätundersökningar innehöll en bortfallsuppföljning. Ett mindre slumpmässigt regionurval bestämdes från början och det var för detta urval som bortfallsuppföljningen gjordes. På så sätt skulle bortfallsuppföljningen bli mer kostnadseffektiv. Ett urval av de frågor som ingick i enkäterna (drygt 70 frågor) ställdes

¹ Tack- och påminnelsekort.

² År 2008 var antalet webbsvar 1 254 stycken vilket var 11,3 procent av de svarande och år 2009 var antalet webbsvar 1 207 stycken, vilket var 11,6 procent av de svarande.

sedan till bortfallet via telefon. I Stockholm har även en bortfallsuppföljning gjorts på folkhälsoenkäten år 2006. I tabell 2 redovisas hur många personer som ingick i regionurvalen, hur många som svarat på postenkäten respektive telefonintervjun.

Tabell 2. Urval och svarsfrekvenser vid postenkät respektive telefonintervju i de olika undersökningarna (procent).

	Regionurval	Svarat på postenkät (%)	Bortfall	Bortfall som svarat på telefonintervju (%)
Norrlandsenkäten 2003	3974	2582 (65)	1392	103 (7)
Göteborgsenkäten 2003	1972	1298 (66)	674	182 (27)
Stockholmsenkäten 2002	7963	4934 (62)	3029	645 (21)
Stockholmsenkäten 2006	7927	4855 (61)	3072	356 (12)

I Stockholmsenkäten 2002 och i Göteborgsenkäten nåddes 21 respektive 27 procent av bortfallet i telefonintervjun. I Norrlandsenkäten nåddes bara 7 procent och i Stockholmsenkäten 2006 nåddes 12 procent av bortfallet. År 2006 gjordes speciella insatser i Stockholm för att minska bortfallet bland utrikes födda. Det är oklart hur detta hanterats för det speciella regionurvalet.

I rapporten redovisas två diagram (”vid”- respektive ”efter” utskick) för varje variabel. Diagrammet till vänster redovisar:

- svaren vid första utskicket
- vid andra utskicket (i stockholmsenkäterna efter andra+ tredje utskick)
- vid fjärde utskick (endast Stockholm)
- vid telefonuppföljning
- och slutligen kalibrerat för alla svar totalt (inklusive telefonuppföljningen).

Diagrammet till höger (kumulativt) visar i tur och ordning:

- svaren efter första utskicket
- svaren efter första+ andra utskicket (i stockholmsenkäterna efter första+ andra+ tredje utskicket)
- efter första+ andra+ tredje+ fjärde utskicket (endast stockholmsenkäterna)
- efter första+ andra (+ tredje+ fjärde, endast i stockholmsenkäterna)+ telefonintervju
- och slutligen kalibrerat för alla svar totalt (inklusive telefonuppföljningen).

Alla de som svarat på enkäten jämförs också med dem som svarat på telefonuppföljningen och chi-2 för oberoende har beräknats för de oviktade svaren.

Här kommer först de tre enkäterna som gjordes åren 2002-2003 att redovisas. De frågor som valts att redovisas är dåligt hälsotillstånd, fetma, dagligrökare, dricker inte alkohol, saknar emotionellt stöd samt saknar kontantmarginal. Norrlandsenkäten och Göteborgsenkäten jämförs också då det gäller dagar med god kroppslig hälsa, dålig

tandhälsa, dagar med god psykisk hälsa samt saknar tillit. Stockholmsenkäterna åren 2002 respektive 2006 jämförs också.

De skillnader i hälsa, levnadsvanor och trygghet som kommenteras i rapporten är alla statistiskt säkerställda om inget annat anges.

Definition av redovisade variabler

Dålig hälsa har de som svarat att deras allmänna hälsotillstånd är dåligt eller mycket dåligt.

Dagar med god kroppslig respektive god psykisk hälsa: Andel dagar (av alla möjliga dagar) med god kroppslig respektive god psykisk hälsa³.

Fetma har de som har ett BMI-värde som är 30 eller större. BMI räknas ut genom att ta vikten i kg och dividera med (längden i meter)².

Dålig tandhälsa har de som svarat ganska eller mycket dålig på frågan: Hur tycker du att din tandhälsa är?

Dricker inte alkohol är de som uppgivit att de inte druckit alkohol det senaste året.

Saknar kontantmarginal gör de som inte skulle kunna skaffa fram 14 000 kronor på en vecka om en oförutsedd situation skulle uppstå.

Saknar emotionellt stöd gör de som svarat nej på frågan: Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt?


Saknar tillit gör de som svarat nej på frågan: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?

³ Om vi tänker oss en grupp omfattande 4 personer där individ A hade 0 dagar av nedsatt hälsa (kroppslig eller psykisk) den senaste 30-dagarsperioden, individ B hade 10 dagar, individ C hade 5 dagar och individ D hade 1 dag med nedsatt hälsa (kroppslig eller psykisk). Summan sjuka dagar i denna grupp blir $0+10+5+1=16$ sjuka dagar. Maximalt skulle denna grupp om 4 individer kunna ha $4 \times 30 = 120$ friska dagar. Antalet dagar med god hälsa (kroppslig eller psykisk) blir $120-16=104$ dagar och andelen dagar med god hälsa blir $104/120=87$ procent. I denna grupp är 87 procent av alla dagar under en månad "friska" dvs. är hälsan bra.

Resultat

Norrlandsenkäten

I Norrlands bortfallsuppföljning ställdes nästan alla frågor (75 av 89 frågor) i ursprungliga enkätformuläret till bortfallet. Det urval som skulle bortfallsuppföljas i Norrlandslänet bestod av 3974 personer, 2022 män och 1952 kvinnor. Bortfallet som skulle följas upp utgjordes av 1392 personer och endast 103 av dessa nåddes per telefon. Det slutliga bortfallet i regionurvalet blev 32 procent (figur 1).




Figur 1. Svansfrekvens för hela regionurvalet i Norrlandsenkäten år 2003 efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Källa: Norrlandsenkäten 2003.

Före telefonintervjun hade 65 procent av urvalet svarat, 60 procent av männen och 70 procent av kvinnorna. I telefonintervjun nåddes 3 procent av männen och 2 procent av kvinnorna i hela regionurvalet.

Göteborgsenkäten

I bortfallsuppföljningen i Göteborg ställdes nästan alla frågor (75 av 83 frågor) i ursprungliga enkätformuläret till bortfallet. Det urval som skulle bortfallsuppföljas i Göteborg med omnejd bestod av 1972 personer, 962 män och 1010 kvinnor. Bortfallet som skulle följas upp utgjordes av 674 personer och 182 av dessa nåddes per telefon. Det slutliga bortfallet i regionurvalet blev 25 procent (figur 2).




Figur 2. Svarefrekvens hela regionurvalet i Göteborgsenkäten år 2003 efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Källa: Göteborgsenkäten 2003.

Före telefonintervjun hade 66 procent av urvalet svarat, 63 procent av männen och 69 procent av kvinnorna. I telefonintervjun nåddes 10 procent av männen och 8 procent av kvinnorna i hela regionurvalet.

Stockholmsenkäten 2002

I bortfallsuppföljningen år 2002 i Stockholms län ställdes nästan alla frågor (79 av 99 frågor) i ursprungliga enkätformuläret till bortfallet. Det urval som skulle bortfallsuppföljas i Stockholmsenkäten 2002 bestod av 7963 personer, 3984 män och 3979 kvinnor. Bortfallet som skulle följas upp utgjordes av 3029 personer och 645 av dessa nåddes per telefon. Det slutliga bortfallet i regionurvalet blev 30 procent (figur 3).




Figur 3. Svarefrekvens hela regionurvalet i Stockholmsenkäten år 2002 efter första utskick, andra utskick, tredje och fjärde utskick och efter telefonintervju. Källa: Stockholmsenkäten 2002.

Vid tredje och fjärde utskicket av enkäter svarade ytterligare 5 procent av männen, 3 procent av kvinnorna och totalt inkom ytterligare 5 procent svar från regionurvalet. Före telefonintervjun hade 62 procent av urvalet svarat, 56 procent av männen och 68 procent av kvinnorna. I telefonintervjun nåddes 9 procent av männen och 8 procent av kvinnorna i hela regionurvalet.

Stockholmsenkäten 2006

I bortfallsuppföljningen år 2006 i Stockholms län ställdes också nästan alla frågor (svårt att säga exakt hur många då det år 2006 fanns två frågeformulär, ett till unga och ett till gamla) i ursprungliga enkätformuläret till bortfallet. Det urval som skulle bortfallsuppföljas i Stockholmsenkäten 2006 bestod av 7927 personer, 3946 män och 3981 kvinnor. Bortfallet som skulle följas upp utgjordes av 3072 personer och 356 av dessa nåddes per telefon. Det slutliga bortfallet i regionurvalet blev 33 procent (figur 4).




Figur 4. Svarsfrekvens hela regionurvalet i Stockholmsenkäten år 2006 efter första utskick, andra utskick, tredje och fjärde utskick, efter webbenkät och efter telefonintervju.

Vid tredje och fjärde utskicket av enkäter svarade ytterligare 4 procent av männen, 5 procent av kvinnorna och totalt inkom ytterligare 4 procent svar från regionurvalet. Före telefonintervjun hade 61 procent av urvalet svarat, 55 procent av männen och 67 procent av kvinnorna. I telefonintervjun nåddes 5 procent av männen, 4 procent av kvinnorna och totalt 4 procent av hela regionurvalet.

Kroppslig hälsa


Genomgående redovisas två figurer för varje tillstånd. Figuren till höger redovisar svaren vid ett visst utskick och figuren till höger redovisar den kumulativa svarsfördelningen (se förklaring sidan 3 i rapporten).

Dåligt allmänt hälsotillstånd




Figur 5. Andel(procent) med dålig hälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Viktat för åldersstratifierat urval. Källa: Norrlandsenkäten 2003.

I Norrlandsenkäten hade de som svarade senare en något bättre hälsa jämfört med dem som svarade först (inte statistiskt säkerställt, vänstra figuren).



Figur 6. Andel(procent) med dålig hälsa efter första utskick, andra utskick, tredje och fjärde utskick och efter telefonintervju. Källa: Stockholmsenkäten 2002.

I Stockholmsenkäten år 2002 var det en större andel med dålig hälsa bland dem som svarade på telefonintervjun jämfört med dem som svarade vid första utskicket (vänster figur).



Figur 7. Andel(procent) med dålig hälsa⁴ efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Källa: Göteborgsenkäten 2003.

I Göteborgsenkäten var svarsalternativen formulerade på annat sätt än i Norrland och Stockholm vilket innebär att andelen med dålig hälsa var betydligt mindre än i de andra enkäterna.

Inga skillnader i dålig hälsa var statistiskt säkerställda i Göteborgsenkäten. Intressant är att dålig hälsa var lika vanligt i den äldsta åldersgruppen i Göteborg som i motsvarande åldersgrupp i Stockholm (se tabell 5a i tabellbilagan). Detta trots de olikheter som förelåg i svarsalternativen på frågan om allmänt hälsotillstånd.


Dagar med god kroppslig hälsa

Enkäterna i Norrland och Göteborg innehöll frågorna om Healthy Days. Utifrån dessa frågor har andel dagar med god kroppslig respektive god psykisk hälsa beräknats.

⁴ I Västra Götalands enkät hade frågan andra svarsalternativ än i Stockholm och Norrlandsenkäterna. Det var 5 svarsalternativ och bara ett av alternativen innebar dålig hälsa, svarsalternativen var: Utmärkt, Mycket god, God, Någorlunda och Dålig.

Andel dagar med god kroppslig respektive god psykisk hälsa beräknas enligt:


Om vi tänker oss en grupp omfattande 4 personer där individ A hade 0 dagar av nedsatt hälsa (kroppslig eller psykisk) den senaste 30-dagarsperioden, individ B hade 10 dagar, individ C hade 5 dagar och individ D hade 1 dag med nedsatt hälsa (kroppslig eller psykisk). Summan sjuka dagar i denna grupp blir $0+10+5+1=16$ sjuka dagar. Maximalt skulle denna grupp om 4 individer kunna ha $4 \times 30 = 120$ friska dagar. Antalet dagar med god hälsa (kroppslig eller psykisk) blir $120 - 16 = 104$ dagar och andelen dagar med god hälsa blir $104/120 = 87$ procent. I denna grupp är 87 procent av alla dagar under en månad "friska" dvs. är hälsan bra.



Figur 8. Andel (procent) dagar med god kroppslig hälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Viktat för åldersstratifierat urval. Källa: Norrlandsenkäten 2003.

Männen i Norrland hade i större utsträckning god kroppslig hälsa vid det andra utskicket jämfört med vid det första.

Det var också en större andel med god kroppslig hälsa bland dem med kort utbildning som svarade vid andra utskicket och bland dem med mellanlång utbildning vid telefonintervjun jämfört med dem vid första utskicket. Övriga skillnader var inte statistiskt säkerställda (tabell 8 i bilagan).



Figur 9. Andel(procent) dagar med god kroppslig hälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Källa: Göteborgsenkäten 2003.

Enligt Göteborgsenkäten hade de som svarade först en något bättre kroppslig hälsa än de som svarade senare (inte statistiskt säkerställt). Inga skillnader var statistiskt säkerställda (tabell 8 i bilagan).

Fetma

Det var något vanligare med fetma bland de i Norrland som svarade först än bland dem som svarade vid andra utskicket (tabell 10a i bilagan).

Det var i stort sett inga skillnader i fetma ju fler som svarade i Stockholmsenkäten. Kalibreringsvikten förändrade heller inte andelen med fetma bland kvinnor och män i Stockholm. Inga statistiskt säkerställda skillnader fanns heller mellan olika åldrar och utbildningsnivå i Stockholmsenkäten (tabell 10a i bilagan).

Inga statistiskt säkerställda skillnader fanns mellan fetma i olika grupper enligt Göteborgsenkäten (tabell 10a i bilagan).


Tandhälsa

Inga statistiskt säkerställda skillnader i tandhälsa fanns mellan i olika grupper enligt Norrlandsenkäten (tabell 12 i bilagan).

Inga statistiskt säkerställda skillnader i dålig tandhälsa fanns mellan olika grupper enligt Göteborgsenkäten (tabell 12 i bilagan).


Psykisk hälsa

Dagar med god psykisk hälsa



Figur 10. Andel(procent) dagar med god psykisk hälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Viktat för åldersstratifierat urval. Källa: Norrlandsenkäten 2003.

De som svarade vid telefonintervjun i Norrlandsenkäten hade betydligt bättre psykisk hälsa än de som svarade tidigare. Det var främst kvinnor och de i 16-29 års ålder som hade bättre hälsa i telefonintervjun (tabell 14 i bilagan). Antalet personer som svarat på telefonintervjun är dock litet varför prevalensen totalt endast påverkas marginellt.




Figur 11. Andel(procent) dagar med god psykisk hälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Källa: Göteborgsenkäten 2003.

Det var även i Göteborgsenkäten en större andel personer (inte statistiskt säkerställt) med god psykisk hälsa som svarat vid telefonintervjun än vid det första utskicket (vänstra figuren). Antalet personer som svarat på telefonintervjun är dock litet varför prevalensen totalt endast påverkas marginellt.


Levnadsvanor

Röker dagligen



Figur 12. Andel (procent) som röker dagligen efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Viktat för åldersstratifierat urval. Källa: Norrlandsenkäten 2003.


Inga statistiskt säkerställda skillnader i andel dagligrökare fanns mellan olika grupper enligt Norrlandsenkäten.



Figur 13. Andel (procent) som röker dagligen efter första utskick, andra utskick, tredje och fjärde utskick och efter telefonintervju. Källa: Stockholmsenkäten 2002.

Det var en större andel som svarat att de röker dagligen enligt telefonintervjun än vid första utskicket. En större andel rökte dagligen bland kvinnor som svarade vid andra eller tredje utskicket och vid telefonintervjun jämfört med kvinnor som svarade vid första utskicket (vänstra figuren). Män, de i åldersgruppen 30-44 år och de med kort

utbildning rökte dagligen i större utsträckning enligt telefonintervjun än dem som svarade vid första utskicket (tabell 16a i bilagan). Förändringarna i prevalenser efter olika utskick är dock inte statistiskt säkerställda (högra figuren).



Figur 14. Andel(procent) som röker dagligen efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Källa: Göteborgsenkäten 2003.

I åldern 16-29 år var det en betydligt större andel som rökte dagligen bland dem som svarade efter andra utskicket jämfört med dem som svarade efter första (tabell 16a i bilagan). Övriga skillnader i prevalens vid olika utskick var inte statistiskt säkerställda i Göteborgsenkäten.

Dricker inte alkohol

En större andel av dem i Norrland som svarade vid första utskicket drack inte alkohol jämfört med dem som svarade vid andra utskicket eller vid telefonintervjun. Det var främst de i åldern 30-44 år och norrlänningar med kort utbildning som inte drack alkohol vid första utskicket. Andelen kvinnor i Norrland som inte drack alkohol var mindre vid telefonintervjun än vid första utskicket (tabell 18a i bilagan).

Det var en mindre andel som inte drack alkohol bland stockholmare som svarade vid första utskicket än bland dem som svarade vid andra, tredje utskicket eller vid telefonintervjun. Det var främst bland stockholmare i åldern 45-84 år och de med kort utbildning som andelen som inte drack alkohol var mindre vid första utskicket. Bland kvinnliga stockholmare som svarade vid andra, tredje, fjärde eller vid telefonintervjun fanns en större andel som inte drack alkohol än bland dem som svarade vid första utskicket (tabell 18a i bilagan).

Inga skillnader i andelen som inte dricker alkohol efter eller vid olika utskick var statistiskt säkerställda i Göteborgsenkäten (tabell 18a i bilagan).

Trygghet och sociala relationer

Saknar emotionellt stöd

Inga skillnader i andelen som saknar emotionellt stöd efter eller vid olika utskick var statistiskt säkerställda i Norrlandsenkäten (tabell 20a i bilagan).

De stockholmare som svarade vid första utskicket saknade emotionellt stöd i större utsträckning än de som svarade vid telefonintervjun. Det var främst manliga stockholmare och stockholmare med kort utbildning som saknade emotionellt stöd i större utsträckning vid första utskicket (tabell 20a i bilagan).

Inga skillnader i andelen som saknar emotionellt stöd efter eller vid olika utskick var statistiskt säkerställda i Göteborgsenkäten (tabell 20a i bilagan).


Litar inte på andra människor (saknar tillit)

Inga skillnader i andelen som saknar tillit efter eller vid olika utskick var statistiskt säkerställda i Norrlandsenkäten (tabell 22 i bilagan).

En större andel av Göteborgarna som svarade vid andra utskicket saknade tillit till andra människor jämfört med dem som svarade vid första utskicket (tabell 22 i bilagan). Övriga skillnader var inte statistiskt säkerställda.


Ekonomiska resurser

Saknar kontantmarginal



Figur 15. Andel(procent) som saknar kontantmarginal efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Viktat för åldersstratifierat urval. Källa: Norrlandsenkäten 2003.


Kvinnor och de som var 65-84 år som svarade vid andra utskicket saknade kontantmarginal i större utsträckning än de som svarade vid första utskicket. De i åldersgruppen 16-29 år som svarade vid telefonintervjun saknade kontantmarginal i betydligt mindre utsträckning än de som svarade vid första utskicket (tabell 24 i bilagan).



Figur 16. Andel(procent) som saknar kontantmarginal efter första utskick, andra utskick, tredje och fjärde utskick och efter telefonintervju. Källa: Stockholmsenkäten 2002.

De stockholmare som svarade vid andra och tredje utskicket saknade kontantmarginal i större utsträckning än de som svarade vid första utskicket (vänstra figuren). Det var

främst kvinnor och män, äldre och de med mellanlång utbildning som saknade kontantmarginal i större utsträckning vid andra utskicket (tabell 24 i bilagan). Bland dem i åldern 16-29 år fanns en betydligt mindre andel som saknade kontantmarginal bland dem som svarade vid telefonintervjun än bland dem som svarade vid första utskicket.



Figur 17. Andel(procent) som saknar kontantmarginal efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju. Källa: Göteborgsenkäten 2003.


De göteborgare som svarade vid telefonintervjun saknade kontantmarginal i mindre utsträckning än de som svarade vid första eller andra utskicket (vänstra figuren). Det var främst de med mellanlång utbildning som saknade kontantmarginal i mindre utsträckning vid telefonintervjun jämfört med dem som svarade vid första eller andra utskicket (tabell 24 i bilagan). Bland kvinnor och dem i åldern 16-29 år fanns en betydligt större andel som saknade kontantmarginal bland dem som svarade vid andra utskicket än bland dem som svarade vid första.

Jämförelse av bortfall i Stockholm åren 2002 och 2006

I detta avsnitt jämförs bortfallsuppföljningarna som gjorts i Stockholms län åren 2002 och 2006. Frågeställningen är om bortfallet har förändrats under dessa år. I undersökningen år 2002 var bortfallet 38 procent och efter uppföljningen minskade det med 8 procentenheter. År 2006 var bortfallet 39 procent och minskade med 5 procentenheter efter uppföljningen. De frågor som kommer att jämföras är: dåligt hälsotillstånd, fetma, daglig rökning, dricker inte alkohol och saknar emotionellt stöd.

I 2006 års undersökning har de som besvarat enkäten på webben redovisats för sig vilket innebär att jämförbarheten minskar. De som svarat på webbenkäten är yngre än övriga svarande.

Dålig hälsa



Figur 18. Andel (procent) som har dålig hälsa efter första, andra tredje och fjärde utskick, efter webbenkät och efter telefonintervju. Källa: Stockholmsenkäterna 2002 och 2006.

Vid båda undersökningstillfällena hade de som svarade senare sämre hälsa än de som svarade efter första utskicket. Detta mönster var mer uttalat i 2002 års undersökning (tabell 6a och 6b i bilagan).

Fetma

Inga statistiskt säkerställda skillnader i svarsmönster mellan de båda åren fanns bland dem med fetma (tabell 10a och 10b i bilagan).

Röker dagligen



Figur 19. Andel (procent) som röker dagligen efter första, andra tredje och fjärde utskick, efter webbenkät och efter telefonintervju. Källa: Stockholmsenkäterna 2002 och 2006.

Inga statistiskt säkerställda skillnader i svarsmönster mellan de båda åren kan ses (tabell 16a och 16b i bilagan).

Dricker inte alkohol

Inga statistiskt säkerställda skillnader i svarsmönster mellan de båda åren fanns bland dem som inte dricker alkohol (tabell 18a och 18b i bilagan).

Saknar emotionellt stöd

En mindre andel män som svarade på telefonintervjun år 2006 saknade emotionellt stöd jämfört med män år 2002. I övrigt fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i svarsmönster mellan de båda åren (tabell 20a och 20b i bilagan).

Jämförelse mellan svarande på enkät respektive telefonuppföljning

Alla som svarat på enkäten jämförs här med bortfallet som telefonintervjuats hur svaren fördelas efter kön, ålder och utbildningsnivå. Norrlandsenkätens bortfallsuppföljning har bara lyckats nå 103 personer vilket innebär att slumpen har ett stort utrymme här. Resultaten är mycket svårtolkade i Norrlandmaterialet varför detta utesluts i detta avsnitt. Chi2 test för oberoende med 2 frihetsgrader har gjorts och p-värdet redovisas i tabellerna.

Tabell 3. Andel(procent) med *dålig hälsa*. Chi2-test (2 frihetsgrader) för oberoende av fördelningen efter alla utskick jämfört med telefonintervju (* Oberoende $p < 0,05$).

	Efter alla utskick, %,A	Vid telefonintervju, %, B	Chi2 A/B, p-värde
Göteborg⁵	N=1298	N=181	
Totalt	3,8	6,1	0,1411
Män	3,2	2,0 (n≤5)	0,2334 ⁶
Kvinnor	4,3	10,8	0,0112*
16-29 år	0,8	3,3	0,1377
30-44 år	1,8	5,6	0,0901
45-64 år	5,5	4,3	0,2693
65-84 år	7,5	20,0	0,0598
Utbildning			
Kort	7,6	9,3	0,1834
Mellanlång	2,7	3,6	0,2263
Lång	1,5	7,0	0,0462*
Stockholm, 2002	N=4934	N=644	
Totalt	5,8	8,5	0,0065*
Män	5,0	7,7	0,0437*
Kvinnor	6,5	9,5	0,0451*
18-29 år	2,3	4,2	0,1710
30-44 år	4,8	7,3	0,1012
45-64 år	7,1	12,4	0,0162*
65-84 år	7,9	13,0	0,0919
Utbildning			
Kort	7,9	9,6	0,3161
Mellanlång	4,4	4,5	0,9567
Lång	2,9	8,6	0,0055*
Stockholm, 2006	N=4855	N=356	
Totalt	5,7	6,5	0,5188
Män	5,4	2,9	0,1276
Kvinnor	5,9	11,3	0,0068*
18-29 år	2,8	2,8	0,9820
30-44 år	3,6	3,1	0,7923
45-64 år	6,9	10,8	0,1707
65-84 år	8,9	18,4	0,0469*
Utbildning			
Kort	7,7	8,0	0,8868
Mellanlång	4,1	3,6	0,1982
Lång	3,4	5,0	0,1953

⁵ I Göteborgs enkät har frågan andra svarsalternativ än i Stockholm och Norrlandsenkäterna. Det är 5 svarsalternativ och bara ett av alternativen innebär dålig hälsa, svarsalternativen är: Utmärkt, Mycket god, God, Någorlunda och Dålig.

⁶ Då antalet i en eller fler celler är mindre än 5 anges p-värdet för Fishers exakta test.

En större andel uppger att de har dålig hälsa i telefonintervjun jämfört med i enkäten men det är bara i Stockholmsenkäten 2002 som skillnaden är statistiskt säkerställd. Kvinnor i telefonintervjun har sämre hälsa än de som svarade på enkäten. I Stockholmsenkäten 2002 hade även männen som telefonintervjuades sämre hälsa än män som svarade på enkäten. I Stockholmsenkäten 2002 hade 45-64-åringar som telefonintervjuades sämre hälsa än de som svarade på enkäten och i enkäten 2006 gällde detsamma för 65-84-åringar. Andelen med lång utbildning i Göteborgsenkäten och Stockholmsenkäten 2002 som hade telefonintervjuats hade sämre hälsa än dem som svarat på enkäten.

Tabell 4. Andel(procent) med fetma (BMI \geq 30). Chi2-test (2 frihetsgrader) för oberoende av fördelningen efter alla utskick jämfört med telefonintervju (* Oberoende $p<=0,05$).

	Efter alla utskick, %, A	Vid telefonintervju, %, B	Chi2 A/B, p-värde
Göteborg	N=1298	N=182	
Totalt	9,6	8,9	0,7877
Män	8,7	11,1	0,4375
Kvinnor	10,3	6,3	0,2469
16-29 år	2,7	6,7	0,1294
30-44 år	9,4	13,0	0,4105
45-64 år	12,3	6,7	0,2652
65-84 år	12,9	10,0	0,7130
Utbildning			
Kort	10,8	5,7	0,2479
Mellanlång	11,0	13,1	0,5657
Lång	5,7	4,8	0,7956
Stockholm 2002,	N=4934	N=645	
Totalt	9,5	9,8	0,8410
Män	10,2	10,2	0,9840
Kvinnor	9,0	9,3	0,8319
18-29 år	4,4	4,3	0,9899
30-44 år	7,9	8,2	0,8798
45-64 år	12,4	17,4	0,0745
65-84 år	10,8	10,8	0,9991
Utbildning			
Kort	12,9	12,3	0,7838
Mellanlång	8,7	7,6	0,6205
Lång	5,1	7,5	0,3549
Stockholm 2006,	N=4756	N=341	
totalt	9,3	8,5	0,6448
Män	9,7	7,0	0,2080
Kvinnor	8,9	10,7	0,4647
18-29 år	3,7	1,9	0,3573
30-44 år	7,6	9,1	0,5567
45-64 år	11,2	18,5	0,0436*
65-84 år	12,9	2,9	0,0488*
Utbildning			
Kort	12,0	13,4	0,6062
Mellanlång	8,9	5,7	0,2449
Lång	5,1	3,4	0,5808

Prevalenserna för fetma tycks inte vara oberoende av varandra annat än bland 45-64-åringar och 65-84-åringar i Stockholmsenkäten 2006.

Tabell 5. Andel(procent) som röker dagligen. Chi2-test (2 frihetsgrader) för oberoende av fördelningen efter alla utskick jämfört med telefonintervju (* Oberoende $p \leq 0,05$).

	Efter alla utskick, %, A	Vid telefonintervju, %, B	Chi2 A/B, p-värde
Göteborg	N=1284	N=180	
Totalt	17,1	19,4	0,4440
Män	15,1	19,4	0,2797
Kvinnor	18,9	19,5	0,8929
16-29 år	10,6	16,7	0,1915
30-44 år	16,6	14,8	0,7426
45-64 år	23,6	27,7	0,5336
65-84 år	13,5	21,1 (n<5)	0,3638
Utbildning			
Kort	20,9	24,1	0,5944
Mellanlång	19,7	21,7	0,6762
Lång	8,4	9,3	0,8479
Stockholm 2002,	N=4901	N=644	
Totalt	16,4	22,8	0,0001*
Män	14,7	20,7	0,0046*
Kvinnor	17,8	25,3	0,0016*
18-29 år	12,6	16,8	0,1462
30-44 år	15,2	24,6	0,0003*
45-64 år	21,2	27,5	0,0718
65-84 år	12,1	21,7	0,0084*
Utbildning			
Kort	25,2	32,0	0,0119*
Mellanlång	12,4	17,4	0,0480*
Lång	8,7	7,4	0,6948
Stockholm 2006,	N=4756	N=341	
totalt	14,4	20,0	0,0040*
Män	13,8	18,5	0,0628
Kvinnor	14,9	22,0	0,0183*
18-29 år	15,1	20,6	0,1476
30-44 år	11,2	15,0	0,2005
45-64 år	18,0	9,7	0,0223*
65-84 år	11,6	12,0 (n<5)	0,0903
Utbildning			
Kort	22,3	29,2	0,0487*
Mellanlång	12,4	13,6	0,7096
Lång	7,6	10,0	0,5037

Bortfallet som telefonintervjuats har nästan genomgående en större andel som röker dagligen. I Stockholmsenkäten 2002 är andelen dagligrökare både bland män och kvinnor, 30-44-åringar, 65-84-åringar och dem med kort respektive mellanlång utbildning större i bortfallet än bland dem som besvarade enkäten. I Stockholmsenkäten 2006 var andelen som röker dagligen större i bortfallet bland kvinnor och dem med kort utbildning och mindre bland dem i åldern 45-64 år jämfört med dem som svarade på enkäten.

Tabell 6. Andel(procent) som *inte dricker alkohol*. Chi2-test (2 frihetsgrader) för oberoende av fördelningen efter alla utskick jämfört med telefonintervju (* Oberoende $p \leq 0,05$).

	Efter alla utskick, %, A	Vid telefonintervju, %, B	Chi2 A/B, p-värde
Göteborg	N=1280	N=179	
Totalt	40,6	43,6	0,4522
Män	31,5	36,1	0,3749
Kvinnor	48,5	52,4	0,5043
16-29 år	43,6	53,3	0,1699
30-44 år	38,9	30,2	0,2202
45-64 år	33,5	40,4	0,3416
65-84 år	54,5	57,9	0,7788
Utbildning			
Kort	57,0	57,4	0,9575
Mellanlång	37,1	39,0	0,7355
Lång	29,3	34,9	0,4524
Stockholm 2002,	N=4874	N=640	
Totalt	11,1	17,3	0,0001*
Män	7,6	9,5	0,2224
Kvinnor	14,1	26,0	0,0001*
18-29 år	9,8	14,5	0,0764
30-44 år	9,0	12,7	0,0755
45-64 år	8,9	11,1	0,3628
65-84 år	20,3	44,6	0,0001*
Utbildning			
Kort	13,7	18,9	0,0186*
Mellanlång	7,6	9,0	0,4854
Lång	6,7	7,5	0,7813
Stockholm 2006,	N=4756	N=341	
totalt	12,7	14,5	0,3528
Män	9,3	8,3	0,6461
Kvinnor	15,5	22,8	0,0179*
18-29 år	13,4	9,3	0,2390
30-44 år	10,5	13,5	0,3053
45-64 år	10,6	13,4	0,4245
65-84 år	19,8	34,2	0,0305*
Utbildning			
Kort	14,9	13,0	0,5167
Mellanlång	9,5	9,1	0,8903
Lång	8,3	13,3	0,1724

Totalt var det en större andel i Stockholmsenkäten 2002 som inte drack alkohol i telefonintervjun än bland dem som svarade på enkäten. Det var också en större andel kvinnor, 65-84-åringar och personer med kort utbildning som drack mindre alkohol jämfört med dem som svarat på enkäten. I Stockholmsenkäten 2006 var det också en större andel kvinnor och 65-84-åringar som drack mindre alkohol jämfört med dem som svarat på enkäten.

Tabell 7. Andel(procent) som saknar emotionellt stöd. Chi2-test (2 frihetsgrader) för oberoende av fördelningen efter alla utskick jämfört med telefonintervju (* Oberoende $p \leq 0,05$).

	Efter alla utskick, %, A	Vid telefonintervju, %, B	Chi2 A/B, p-värde
Göteborg	N=1277	N=177	
Totalt	11,8	7,3	0,0819
Män	15,2	11,5	0,3392
Kvinnor	7,8	2,5 (n≤5)	0,0494*
16-29 år	9,4	5,0	0,2690
30-44 år	10,4	3,8	0,1229
45-64 år	12,2	12,8	0,9163
65-84 år	16,2	11,8	0,6322
Utbildning			
Kort	15,3	15,1	0,9694
Mellanlång	12,1	3,7	0,0235*
Lång	7,3	4,7	0,5283
Stockholm 2002,	N=4858	N=638	
Totalt	10,8	7,1	0,0038*
Män	13,0	6,0	0,0002*
Kvinnor	8,9	8,3	0,7215
18-29 år	6,0	5,2	0,0110*
30-44 år	9,4	9,4	0,9215
45-64 år	11,6	11,1	0,0165*
65-84 år	15,5	15,4	0,7970
Utbildning			
Kort	13,5	7,0	0,0016*
Mellanlång	9,3	5,0	0,0452*
Lång	7,5	6,3	0,6744
Stockholm 2006,	N=4756	N=341	
totalt	11,0	7,5	0,0448*
Män	13,7	5,5	0,0010*
Kvinnor	8,8	10,2	0,5476
18-29 år	8,4	0,9	0,0064*
30-44 år	10,6	9,7	0,7527
45-64 år	13,1	8,6	0,2399
65-84 år	9,6	17,1	0,1444
Utbildning			
Kort	12,6	7,0	0,0402*
Mellanlång	11,0	6,5	0,1509
Lång	9,3	6,7	0,4897

Nästan genomgående är det en mindre andel som saknat emotionellt stöd bland dem som svarat på telefonintervjun jämfört med dem som svarat på enkäten. Statistiskt säkerställt är detta bland kvinnor och dem med mellanlång utbildning i Göteborgsenkäten. Det är också statistiskt säkerställt i Stockholmsenkäterna totalt och bland män, 16-29-åringar och korttidsutbildade och bland 45-64-åringar och dem med mellanlång utbildning i Stockholmsenkäten 2002.

Tabell 8. Andel(procent) som saknar kontantmarginal. Chi2-test (2 frihetsgrader) för oberoende av fördelningen efter alla utskick jämfört med telefonintervju (* Oberoende $p \leq 0,05$).

	Efter alla utskick, %, A	Vid telefonintervju, %, B	Chi2 A/B, p-värde
Göteborg	N=1281	N=177	
Totalt	24,8	14,7	0,0029*
Män	20,2	13,4	0,1136
Kvinnor	28,8	16,3	0,0170*
16-29 år	28,7	18,3	0,1022
30-44 år	25,1	11,3	0,0267*
45-64 år	23,6	10,9	0,0487*
65-84 år	22,0	22,2	0,9796
Utbildning			
Kort	15,3	26,4	0,3216
Mellanlång	12,1	8,5	0,0005*
Lång	7,3	11,9	0,7779
Stockholm 2002,	N=4884	N=638	
Totalt	18,9	18,5	0,7875
Män	15,1	11,9	0,1237
Kvinnor	22,2	25,9	0,1438
18-29 år	24,8	15,1	0,0070*
30-44 år	21,1	17,4	0,1965
45-64 år	15,2	18,4	0,2936
65-84 år	17,9	27,8	0,0217*
Utbildning			
Kort	26,2	21,5	0,0801
Mellanlång	16,9	12,5	0,1104
Lång	7,8	12,5	0,1433

Nästan genomgående är det en mindre andel som saknar kontantmarginal bland dem som svarat på telefonintervjun än bland dem som svarat på enkäten. I Göteborgsenkäten gällde detta totalt och för kvinnor, 30-64-åringar och de som hade mellanlång utbildning. I Stockholmsenkäten 2002 saknade en mindre andel 16-29-åringar och en större andel av 65-84-åringar bland telefonintervjuade kontantmarginal jämfört med dem som svarade på enkäten.

Diskussion

Bortfallet i folkhälsoenkäter ökar för varje år och därför är det viktigt att veta hur de som utgör det ökade bortfallet ser ut. Liknar personerna i bortfallet dem som svarat? Vanligast förekommande är att registeruppgifter läggs på för hela urvalet och att svarande och bortfall jämförs med avseende på dessa registeruppgifter. Detta görs vanligtvis för att studera bortfallets betydelse (2). Ibland behövs dock svaren på frågor i undersökningen även från bortfallet för att kunna bedöma om personerna i bortfallet har ett avvikande svarsmönster (socialt-, ålders- och/eller könsmässigt) från dem som svarat? För att kunna uttala sig om detta behöver man få in svar från en större andel av bortfallet. I de material som här studerats varierar andelen svarande från bortfallet betydligt från 7 till 27 procent. Även antalsmässigt varierar de som svarat i telefonuppföljningen betydligt från 103 till 645 personer. Detta innebär att skillnaderna måste vara betydliga om svaren från bortfallet ska påverka prevalenserna för hela regionurvalet. En tänkbar orsak till att en så liten andel av bortfallet svarat på bortfallsuppföljningen kan vara att för många frågor ställts. I de bortfallsuppföljningar som här redovisats har över 70 frågor ställts till personerna i bortfallet. Personerna i bortfallet har valt att inte delta i undersökningen av olika skäl. För att få så många som möjligt att delta i en bortfallsuppföljning bör antalet frågor var mycket liten. I de här studerade undersökningarna kanske det bara borde ha varit 10-15 frågor som högst tagit 5 minuter att besvara. Ansträngningarna att nå bortfallet borde också ha varit större. Det är bättre att göra en mindre bortfallsuppföljning och i stället lägga mer resurser på att försöka få så stor andel av bortfallet som möjligt att delta.

I Norrlandslänen där bortfallsuppföljningen lyckats sämst finns vissa avvikelser gentemot Stockholm och Göteborg. Bland annat har de som svarar vid första utskicket dålig hälsa i större utsträckning än de som svarat vid senare utskick. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. I Stockholm har de som svarar senare dålig hälsa i större utsträckning än de som svarat vid första utskicket. I Göteborg återfinns samma mönster som i Stockholm men det är inte statistiskt säkerställt. Samma mönster framkommer för Norrland och Göteborg då det gäller andel dagar med god kroppslig hälsa. Andra regionala skillnader gäller de som inte dricker alkohol. Denna andel minskar i Norrlandslänen vid andra utskick och vid telefonintervjun. I Stockholm ökar andelen och i Göteborg minskar den något först men ökar i telefonintervjun (inte statistiskt säkerställt i Göteborg).

Inga statistiskt säkerställda förändringar i prevalenser kan ses då fler och fler svarar. Däremot avviker prevalenserna för bortfallet och deltagarna i ett flertal fall. Bland annat rökte en större andel dagligen och en större andel kvinnor drack inte alkohol bland bortfallet än bland deltagarna i de bägge stockholmsstudierna. En större andel män bland deltagarna i stockholmsenkäterna saknade emotionellt stöd jämfört med män i bortfallet.

Bortfallet tycks inte ha ett avvikande svarsmönster gentemot de som svarat på enkäten. Detta har säkert bidragit till att kalibreringsvikterna har kompenserat för bortfallet på ett förtjänstfullt sätt. De hjälpvariabler som använts för kalibreringen tycks ha fungerat väl. Kravet på att dessa skulle samvariera med viktiga målvariabler i enkäten har säkert

bidragit till att kalibreringen fungerat så bra. Flera andra studier har också visat att prevalenser kan påverkas av bortfallet men inte undersökta samband (3-5).

I denna studie hade personerna i bortfallet sämre hälsa än de som svarat på enkäten vilket också en studie från Nederländerna (4) visat. I de bägge stockholmsekäterna var andelen dagligrökare större bland bortfallet än bland dem som svarade på enkäten. Detta har även visats i andra studier (4, 6-7). En studie om hur sociala skillnader i rökning påverkas av bortfall på ett material från Stockholm i mitten av 1980-talet visade att bortfallet påverkar de sociala skillnaderna (7). Denna rapport och även andra studier visar att detta samband inte tycks finnas idag (3-5).

Förslag inför framtida bortfallsuppföljningar

Inledning

De bortfallsuppföljningar som här redovisats har gjorts på ett slumpmässigt urval av hela urvalet (här kallat regionurval). För detta regionurval har bortfallsuppföljning gjorts. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att göra bortfallsuppföljning på. Storleken på de regionurval som presenterats i rapporten var som minst 1972 personer och som mest 7963 personer. Andelen personer som nåtts bland bortfallet i regionurvalen varierar mellan 7 och 27 procent. Även antalet personer som nåtts i bortfallsuppföljningen varierar kraftigt (från 103 personer till 645 personer).

I samtliga bortfallsuppföljningar i denna rapport har drygt tre fjärdedelar av de ursprungliga frågorna i frågeformuläret ställts. Det kan vara vanskligt att ställa så många frågor till de personer som trots ett antal påminnelser inte ville delta i undersökningen. Detta kan ha bidragit till att endast en mindre del av bortfallet ville delta i bortfallsuppföljningen.

Denna rapport har visat att bortfallet inte har ett avvikande socialt svarsmönster jämfört med dem som deltog i undersökningen. Detta innebär att kalibreringsvikterna som SCB beräknar kan anses kompensera för det bortfall som finns i undersökningen. Detta skulle kunna testas ytterligare genom att SCB beräknade kalibreringsvikter också för dem som svarat efter första utskicket och att kalibrerade resultat efter första utskicket jämfördes med det kalibrerade slutresultatet. Trots att kalibreringen fungerat bra är det viktigt att regelbundet följa bortfallets svarsmönster. Kalibreringen utgår från att bortfallet har samma sociala svarsmönster som deltagarna. Det är därför viktigt att veta om det sociala svarsmönstret skiljer sig mellan bortfallet och de svarande.

Förslag till framtida bortfallsuppföljningar

För att främst studera om bortfallet har ett avvikande socialt svarsmönster bör bortfallsstudier göra regelbundet, förslagsvis vart 10-15 år.

Ett regionurval (ett slumpmässigt urval av urvalet) för uppföljning av bortfallet bör göras. Detta regionurval ska vara så stort att antalet svarande blir tillräckligt många för att statistiskt säkerställa skillnader av viss storlek. Det är bättre att göra ett mindre

regionurval och lägga ner större ansträngningar på att få in så stor andel som möjligt än att göra ett stort regionurval och få in en mindre andel.

Det kan vara lättare att få bortfallet att delta i bortfallsuppföljningen om antalet frågor minskas betydligt. Försök att välja ut de absolut viktigaste frågorna i undersökningen och ställ endast dessa. Bra om frågeformuläret inte överstiger 4 sidor(10-15 frågor) och tar högst fem minuter att besvara.

Först bör utskick av den förkortade enkäten göras. I följebrevet ska orsaken till utskicket anges och påtalas att det som nu skickas ut är ett fåtal av de frågor som fanns i det tidigare utskickade frågeformuläret, även webbenkät erbjuds i samband med detta. Försök att verkligen motivera urvalspersonerna att delta i denna bortfallsuppföljning. Om det efter två veckor inte inkommit något svar kan försök med telefonintervju göras. Om inte heller telefonintervju fungerar kan även besöksintervju övervägas. I samband med att olika metoder för datainsamling används bör uppmärksammas att olika metoder kan ge olika resultat (8).

Då bortfallsuppföljning ska göras bör denna planeras i samarbete med SCB. De registeruppgifter som SCB använder för kalibreringsvikternas framtagande bör redovisas lite mer detaljerat för deltagare respektive bortfall än som brukligt är i tekniska rapporterna. Exempelvis skulle utbildning, födelseland och inkomst vara könsuppdelat. På detta sätt kan deltagare och bortfall jämföras lite bättre med avseende på registervariablerna varje år.

Referenser

1. Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2009, det nationella urvalet. Teknisk rapport. Örebro: Statistiska centralbyrån;2009.
2. Ainetdin T, Tillgren P. Folkhälsoenkäter och bortfallsproblematik i Stockholms län. Stockholm: Socialmedicin 2001:7.
3. Martikainen P, Laaksonen M, Piha K, Lallukka T. Does survey non-response bias the association between occupational social class and health? *Scand J Publ Health* 2007;35:212-5.
4. van Loon AJM, Tijhuis M, Picavet HSJ, Surtees PG, Ormel J. Survey Non-response in the Netherlands: Effects on prevalence Estimates and Associations. *Ann Epidemiol*.2003 Feb;13(2):105-10.
5. Lemmens PHHM, Tan ES, Knibbe RA. Bias due to Non-response in a Dutch Survey om Alcohol Consumption. *Br J Addict* 1988;83:1069-77.
6. Hill A, Roberts J, Ewings P, Gunnell D. Non-response bias in a lifestyle survey. *J Publ Health Med* 1997;19:203-7.
7. Boström G, Hallqvist J, Haglund BJA, Romelsjö A, Svanström L, Diderichsen F. Socioeconomic Differences in Smoking in an Urban Swedish Population. The bias introduced by non-participation in a mailed questionnaire. *Scand J Soc Med* 1993;21:77-82.
8. Kotaniemi J-T, Hassi J, Kataja M, Jönsson E, Laitinen LA, Sovijärvi ARA, Lundbäck B. Does non-response bias have a significant effect on the results in a postal questionnaire study? *Eur J of Epidemiol* 2001;17:809-17.

Tabellbilaga 1 (32)

Tabell 1a. Svansfrekvens i Norrlandsenkäten år 2003 efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***
Totalt	3974	2224(56)	2582(65)	2685(68)
Kön				
Män	2022	1028(51)	1219(60)	1275(63)
Kvinnor	1952	1196(61)	1363(70)	1410(72)
Ålder				
16-24 år	1324	604(46)	740(56)	788(60)
25-64 år	1326	786(59)	908(68)	944(71)
65-84 år	1324	834(63)	934(71)	957(72)

* I = inkomna svar efter första utskick, antal (%)

** II= I +inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III= II+ inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Tabell 1b. Svansfrekvens i Norrlandsenkäten år 2003 efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***
Totalt	3974	2224(56)	358 (9)	103 (3)
Kön				
Män	2022	1028(51)	191(9)	56(3)
Kvinnor	1952	1196(61)	167(9)	47(2)
Ålder				
16-24 år	1324	604(46)	136(10)	44(3)
25-64 år	1326	786(59)	122(9)	36(3)
65-84 år	1324	834(63)	100(8)	23(2)

* I = inkomna svar efter första utskick, antal (%)

** II= inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III= inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Tabell 2a. Svansfrekvens i Göteborgsenkäten år 2003 efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***
Totalt	1972	1070(54)	1298(66)	1480(75)
Kön				
Män	962	484(50)	604(63)	703(73)
Kvinnor	1010	586(58)	694(69)	777(77)
Ålder				
16-29 år	446	206(46)	265(59)	325(73)
30-44 år	600	307(51)	387(65)	441(74)
45-64 år	609	363(60)	428(70)	475(78)
65-84 år	317	194(61)	218(69)	239(75)
Födelseled				
Sverige	1631	916 (56)	1097 (67)	1256 (77)
Utlandet	341	154 (45)	201 (59)	224 (66)
Inkomst				
Ingen	163	40 (25)	56 (34)	73 (45)
1-159 999	758	403 (53)	482 (64)	540 (71)
160 000-234 999	475	267 (56)	321 (68)	376 (79)
235 000-309 999	311	183 (59)	222 (71)	254 (82)
310 000-	265	166 (63)	200 (75)	219 (83)

* I = inkomna svar efter första utskick, antal (%)

** II = I + inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III = II + inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Tabell 2b. Svansfrekvens i Göteborgsenkäten år 2003 efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***
Totalt	1972	1070 (54)	228 (12)	182(9)
Kön				
Män	962	484 (50)	120 (12)	99 (10)
Kvinnor	1010	586 (58)	108 (11)	83 (8)
Ålder				
16-29 år	446	206 (46)	59 (13)	60 (13)
30-44 år	600	307 (51)	80 (13)	54 (9)
45-64 år	609	363 (60)	65 (11)	47 (8)
65-84 år	317	194 (61)	24 (8)	21 (7)
Födelseled				
Sverige	1631	916 (56)	181 (11)	159 (10)
Utlandet	341	154 (45)	47 (14)	23 (7)
Inkomst				
Ingen	163	40 (25)	16 (10)	17 (10)
1-159 999	758	403 (53)	79 (10)	58 (8)
160 000-234 999	475	267 (56)	54 (11)	55 (12)
235 000-309 999	311	183 (59)	39 (13)	32 (10)
310 000-	265	166 (63)	34 (13)	19 (7)

* I = inkomna svar efter första utskick, antal (%)

** II = inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III = inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Tabell 3a. Svansfrekvens i Stockholmsenkäten år 2002 efter första utskick, andra utskick, tredje utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***	IV****	V*****
Totalt	7963	4173 (52)	4605 (58)	4814 (60)	4934 (62)	5579 (70)
Kön						
Män	3984	1846 (46)	2068 (52)	2197 (55)	2244 (56)	2583 (65)
Kvinnor	3979	2327 (58)	2537 (64)	2635 (66)	2690 (68)	2996 (75)
Ålder						
18-25 år	855	332 (39)	383 (45)	410 (48)	432 (51)	540 (63)
26-45 år	3280	1499 (46)	1692 (52)	1790 (55)	1854 (57)	2152 (66)
46-65 år	2613	1568 (60)	1700 (65)	1761 (67)	1790 (69)	1939 (74)
66-84 år	1215	774 (64)	830 (68)	853 (70)	858 (71)	948 (78)
Födelse land						
Sverige	6214	3509 (56)	3846 (62)	4002 (64)	4093 (66)	4592 (74)
Utlandet	1749	664 (38)	759 (43)	812 (46)	841 (48)	987 (56)
Inkomst						
Ingen	483	106 (22)	130 (27)	145 (30)	155 (32)	200 (41)
1-159 999	2625	1174 (45)	1336 (51)	1418 (54)	1461 (56)	1704 (65)
160 000-234 999	1909	1054 (55)	1161 (61)	1205 (63)	1233 (65)	1392 (73)
235 000-309 999	1310	814 (62)	874 (67)	904 (69)	917 (70)	1019 (78)
310 000-	1636	1025 (63)	1104 (67)	1142 (70)	1168 (71)	1264 (77)

* I = Inkomna svar efter första enkät, antal (%)

** II = I + Inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III = II + Inkomna svar efter tredje utskick, antal (%)

**** IV = III + Inkomna svar efter fjärde utskick, antal (%)

***** V = IV + Inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Tabell 3b. Svarsfrekvens i Stockholmsenkäten år 2002 efter första utskick, andra utskick, tredje utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***	IV****	V*****
Totalt	7963	4173 (52)	432 (5)	209 (3)	120 (2)	645 (8)
Kön						
Män	3984	1846 (46)	222 (6)	111 (3)	65 (2)	339 (9)
Kvinnor	3979	2327 (58)	210 (5)	98 (2)	55 (1)	306 (8)
Ålder						
18-25 år	855	332 (39)	51 (6)	27 (3)	22 (3)	108 (13)
26-45 år	3280	1499 (46)	193 (6)	98 (3)	64 (2)	298 (9)
46-65 år	2613	1568 (60)	132 (5)	61 (2)	29 (1)	149 (6)
66-84 år	1215	774 (64)	56 (5)	23 (2)	5 (0,4)	90 (7)
Födelseland						
Sverige	6214	3509 (56)	337 (5)	156 (3)	91 (1)	499 (8)
Utlandet	1749	664 (38)	95 (5)	53 (3)	29 (2)	146 (8)
Inkomst						
Ingen	483	106 (22)	24 (5)	15 (3)	10 (2)	45 (9)
1-159 999	2625	1174 (45)	162 (6)	82 (3)	43 (2)	243 (9)
160 000-234 999	1909	1054 (55)	107 (6)	44 (2)	28 (1)	159 (8)
235 000-309 999	1310	814 (62)	60 (5)	30 (2)	13 (1)	102 (8)
310 000-	1636	1025 (63)	79 (5)	38 (2)	26 (2)	96 (6)

* I = Inkomna svar efter första enkät, antal (%)

** II = Inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III = Inkomna svar efter tredje utskick, antal (%)

**** IV = Inkomna svar efter fjärde utskick, antal (%)

***** V = Inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Tabell 4a. Svarsfrekvens i Stockholmsenkäten år 2006 efter första utskick, andra utskick, tredje utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***	IV****	V*****	VI*****
Totalt	7927	3318 (42)	3818 (48)	4075 (51)	4122 (52)	4855 (61)	5211 (66)
Kön							
Män	3946	1364 (35)	1607 (41)	1714 (43)	1737 (44)	2177 (55)	2382 (60)
Kvinnor	3981	1954 (49)	2211 (56)	2361 (59)	2385 (60)	2678 (67)	2829 (71)
Ålder							
18-29 år	1550	425 (27)	514 (33)	564 (36)	581 (37)	780 (50)	887 (57)
30-44 år	2490	850 (34)	1004 (40)	1095 (44)	1112 (45)	1398 (56)	1525 (61)
45-64 år	2677	1291 (48)	1469 (55)	1543 (58)	1555 (58)	1766 (66)	1849 (69)
65-84 år	1210	752 (62)	831 (69)	873 (72)	874 (72)	911 (75)	950 (79)
Födelseland							
Sverige	6192	2819 (46)	3180 (51)	3354 (54)	3399 (55)	3989 (64)	4286 (69)
Utlandet	1735	499 (29)	638 (37)	721 (42)	723 (42)	866 (50)	925 (53)
Inkomst							
Ingen	577	100 (17)	138 (24)	162 (28)	164 (28)	213 (37)	249 (43)
1-84 999	1053	306 (29)	371 (35)	414 (39)	424 (40)	530 (50)	586 (56)
85 000-159 999	1243	492 (40)	583 (47)	634 (51)	640 (51)	714 (57)	769 (62)
160 000-234 999	1616	768 (48)	888 (55)	932 (58)	939 (58)	1053 (65)	1123 (69)
235 000-309 999	1463	725 (50)	807 (55)	849 (58)	862 (59)	979 (67)	1037 (71)
310 000-	1975	927 (47)	1031 (52)	1084 (55)	1093 (55)	1366 (69)	1447 (73)

* I = Inkomna svar efter första enkät, antal (%)

** II = I + Inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III = II + Inkomna svar efter tredje utskick, antal (%)

**** IV = III + Inkomna svar efter fjärde utskick, antal (%)

***** V = IV + Inkomna svar efter webbenkät, antal (%)

***** VI = V + Inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Tabell 4b. Svarsfrekvens i Stockholmsenkäten år 2006 efter första utskick, andra utskick, tredje utskick och efter telefonintervju.

	Möjliga svar, antal (%)	I*	II**	III***	IV****	V*****	VI*****
Totalt	7927	3318 (42)	500 (6)	257 (3)	47 (1)	733 (9)	356 (4)
Kön							
Män	3946	1364 (35)	243 (6)	107 (3)	23 (1)	440 (11)	205 (5)
Kvinnor	3981	1954 (49)	257 (6)	150 (4)	24 (1)	293 (7)	151 (4)
Ålder							
18-29 år	1550	425 (27)	89 (6)	50 (3)	17 (1)	199 (13)	107 (7)
30-44 år	2490	850 (34)	154 (6)	91 (4)	17 (1)	286 (11)	127 (5)
45-64 år	2677	1291 (48)	178 (7)	74 (3)	12 (0,4)	211 (8)	83 (3)
65-84 år	1210	752 (62)	79 (7)	42 (3)	1 (0,1)	37 (3)	39 (3)
Födelseland							
Sverige	6192	2819 (46)	361 (6)	174 (3)	45 (0,7)	590 (10)	297 (5)
Utlandet	1735	499 (29)	139 (8)	83 (5)	2 (0,1)	143 (8)	59 (3)
Inkomst							
Ingen	577	100 (17)	38 (7)	24 (4)	2 (0,3)	49 (8)	36 (6)
1-84 999	1053	306 (29)	65 (6)	43 (4)	10 (1)	106 (10)	56 (5)
85 000-159 999	1243	492 (40)	91 (7)	51 (4)	6 (0,5)	74 (6)	55 (4)
160 000-234 999	1616	768 (48)	120 (7)	44 (3)	7 (0,4)	114 (7)	70 (4)
235 000-309 999	1463	725 (50)	82 (6)	42 (3)	13 (1)	117 (8)	58 (4)
310 000-	1975	927 (47)	104 (5)	53 (3)	9 (0,5)	273 (14)	81 (4)

* I = Inkomna svar efter första enkät, antal (%)

** II = Inkomna svar efter andra utskick, antal (%)

*** III = Inkomna svar efter tredje utskick, antal (%)

**** IV = Inkomna svar efter fjärde utskick, antal (%)

***** V = Inkomna svar efter webbenkät, antal (%)

***** VI = Inkomna svar efter telefonintervjuer, antal (%)

Kroppslig hälsa

Dålig hälsa

Tabell 5a. Andel(procent) med **dålig hälsa** efter första utskick, andra utskick, tredje och fjärde utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick	Efter andra, tredje ¹ utskick	Efter fjärde utskick	Efter telefonintervju, %	Kalibrerat, %
Norrland	N=2224	N=2582		N=2685	
Totalt	6,7 (5,7-7,7)	6,4 (5,4-7,4)	-	6,3 (5,4-7,2)	5,1 (4,2-6,0)
Män	5,6 (4,2-7,0)	5,1 (3,8-6,4)	-	5,2 (3,9-6,5)	4,1 (2,8-5,4)
Kvinnor	7,6 (6,2-9,0)	7,6 (6,2-9,0)	-	7,3 (6,0-8,6)	6,1 (4,8-7,4)
16-29 år	2,5 (1,3-3,7)	2,3 (1,3-3,4)	-	2,2 (1,2-3,2)	1,5 (0,7-2,3)
30-44 år	7,1 (3,8-10,4)	6,8 (3,8-9,7)	-	6,7 (3,9-9,6)	5,0 (2,5-7,5)
45-64 år	7,3 (5,0-9,6)	7,0 (4,9-9,2)	-	7,0 (4,9-9,1)	6,3 (4,3-8,3)
65-84 år	8,4 (6,5-10,3)	8,5 (6,7-10,3)	-	8,4 (6,6-10,1)	7,8 (6,1-9,5)
Utbildning					
Kort	7,6 (6,0-9,1)	7,0 (5,6-8,4)	-	7,0 (5,6-8,3)	5,9 (4,7-7,2)
Mellanlång	4,8 (3,1-6,5)	4,4 (2,9-5,9)	-	4,2 (2,8-5,7)	3,4 (2,1-4,8)
Lång	3,3 (0,8-5,7)	4,2 (1,6-6,9)	-	4,2 (1,6-6,8)	3,5 (1,1-5,8)
Stockholm	N=4173	N=4814	N=4934	N=5579	
Totalt	5,4 (4,7-6,1)	5,7 (5,0-6,4)	5,8 (5,1-6,5)	6,1 (5,5-6,7)	6,9 (6,3-7,5)
Män	4,8 (3,8-5,8)	4,9 (4,0-5,8)	5,0 (4,1-5,9)	5,4 (4,5-6,3)	5,9 (5,0-6,5)
Kvinnor	5,8 (4,9-6,7)	6,4 (5,5-7,3)	6,5 (5,6-7,4)	6,8 (5,9-7,7)	7,9 (7,0-8,8)
18-29 år	2,0 (0,9-3,1)	2,3 (1,2-3,3)	2,3 (1,3-3,4)	2,6 (1,6-3,7)	3,3 (2,2-4,5)
30-44 år	4,6 (3,4-5,8)	4,7 (3,6-5,9)	4,8 (3,7-5,9)	5,1 (4,1-6,2)	5,8 (4,7-7,0)
45-64 år	6,4 (5,2-7,6)	7,0 (5,8-8,2)	7,1 (5,9-8,3)	7,5 (6,3-8,7)	8,9 (7,6-10,1)
65-84 år	6,9 (5,2-8,6)	7,7 (6,0-9,5)	7,9 (6,2-9,7)	8,4 (6,7-10,1)	10,0 (8,1-11,8)
Utbildning					
Kort	7,5 (6,2-8,8)	7,8 (6,5-9,0)	7,9 (6,7-9,1)	8,1 (7,0-9,3)	8,9 (7,7-10,1)
Mellanlång	3,8 (2,8-4,9)	4,4 (3,3-5,4)	4,4 (3,4-5,4)	4,4 (3,5-5,3)	4,8 (3,9-5,8)
Lång	2,9 (1,8-4,0)	3,0 (1,9-4,0)	2,9 (1,9-3,9)	3,3 (2,3-4,4)	3,6 (2,5-4,7)
Göteborg²	N=1070	N=1298		N=1480	
Totalt	3,5 (2,4-4,6)	3,8 (2,7-4,9)	-	4,1 (3,1-5,1)	3,9 (2,9-4,9)
Män	2,9 (1,4-4,4)	3,2 (1,8-3,6)	-	3,0 (1,7-4,3)	3,0 (1,7-4,3)
Kvinnor	4,0 (2,4-5,6)	4,3 (2,8-5,8)	-	5,0 (3,4-6,6)	4,9 (3,3-6,5)
16-29 år	0,5 (-0,5-1,4)	0,8 (-0,3-1,8)	-	1,2 (0,0-2,4)	1,2 (0,0-2,3)
30-44 år	1,3 (0,0-2,6)	1,8 (0,5-3,2)	-	2,3 (0,9-3,7)	2,2 (0,8-3,6)
45-64 år	5,3 (3,0-7,6)	5,5 (3,3-7,7)	-	5,4 (3,3-7,4)	5,4 (3,3-7,4)
65-84 år	6,9 (3,3-10,5)	7,5 (4,0-11,1)	-	8,6 (5,1-12,2)	9,8 (6,0-13,5)
Utbildning					
Kort	6,3 (3,5-9,0)	7,6 (4,9-10,3)	-	7,8 (5,2-10,4)	7,2 (4,7-9,7)
Mellanlång	3,3 (1,7-4,9)	2,7 (1,4-4,0)	-	2,8 (1,6-4,1)	2,5 (1,4-3,7)
Lång	1,1 (-0,1-2,3)	1,5 (0,2-2,8)	-	2,2 (0,7-3,6)	2,4 (0,9-4,0)

¹ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

² I Göteborgs enkät har frågan andra svarsalternativ än i Stockholm och Norrlandsenkätorna. Det är 5 svarsalternativ och bara ett av alternativen innebär dålig hälsa, svarsalternativen är: Utmärkt, Mycket god, God, Någorlunda och Dålig.

Tabell 5b. Andel(procent) med **dålig hälsa** efter första utskick, andra utskick, tredje och fjärde utskick, webbenkät och efter telefonintervju.

	Efter första utskick	Efter andra, tredje utskick	Efter fjärde utskick	Efter webbenkät	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat (%)
Stockholm 2006, totalt	N=3318 5,5 (4,7-6,2)	N=3818 5,9 (5,2-6,7)	N=4122 6,0 (5,3-6,7)	N=4855 5,7 (5,0-6,3)	N=5211 5,7 (5,1-6,4)	N=5211 6,0 (5,3-6,7)
Män	5,3 (4,1-6,5)	5,9 (4,7-7,0)	6,0 (4,9-7,1)	5,4 (4,4-6,4)	5,2 (4,3-6,1)	5,5 (4,6-6,4)
Kvinnor	5,6 (4,5-6,6)	6,0 (5,0-7,0)	6,0 (5,0-6,9)	5,9 (5,0-6,8)	6,2 (5,3-7,1)	6,5 (5,6-7,4)
18-29 år	3,1 (1,4-4,7)	3,1 (1,6-4,6)	2,8 (1,4-4,1)	2,8 (1,7-4,0)	2,8 (1,7-3,9)	3,1 (1,9-4,2)
30-44 år	3,0 (1,8-4,1)	3,2 (2,1-4,3)	3,6 (2,5-4,7)	3,6 (2,6-4,6)	3,6 (2,6-4,5)	4,2 (3,2-5,2)
45-64 år	6,1 (4,8-7,4)	7,2 (5,9-8,5)	7,3 (6,0-8,6)	6,9 (5,7-8,1)	7,1 (5,9-8,2)	7,9 (6,6-9,1)
65-84 år	8,6 (6,6-10,6)	8,9 (6,9-10,8)	8,8 (6,9-10,7)	8,9 (7,0-10,7)	9,3 (7,4-11,1)	9,9 (8,0-11,8)
Utbildning						
Kort	7,5 (6,0-9,0)	8,3 (6,8-9,7)	8,2 (6,8-9,6)	7,7 (6,4-9,0)	7,7 (6,5-9,0)	8,2 (7,0-9,5)
Mellanlång	3,7 (2,6-4,9)	4,1 (3,0-5,1)	4,3 (3,2-5,3)	4,1 (3,2-5,1)	4,1 (3,2-5,0)	4,3 (3,4-5,3)
Lång	2,9 (1,7-4,0)	3,2 (2,1-4,4)	3,4 (2,2-4,5)	3,4 (2,3-4,4)	3,5 (2,4-4,5)	3,4 (2,4-4,4)

Tabell 6a. Andel med dålig hälsa vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och vid telefonintervjun.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje ³ utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid telefonintervjun, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2176	N=206		N=103	N=2485
Totalt	6,7 (5,7-7,7)	3,8 (1,2-6,4)		4,3 (n≤5)	5,1 (4,2-6,0)
Män	5,6 (4,2-7,0)	0,5 (n≤5)		7,1 (n≤5)	4,1 (2,8-5,4)
Kvinnor	7,6 (6,2-9,0)	7,5 (2,4-12,6)		0,0 (n≤5)	6,1 (4,8-7,4)
16-29 år	2,5 (1,3-3,7)	0,8 (-0,6-2,3)		0,0 (0,0-0,0)	1,5 (0,7-2,3)
30-44 år	7,1 (3,8-10,4)	4,0 (-1,6-9,6)		5,9 (-5,3-17,1)	5,0 (2,5-7,5)
45-64 år	7,3 (5,0-9,6)	3,3 (-1,1-7,7)		7,1 (-6,3-20,6)	6,3 (4,3-8,3)
65-84 år	8,4 (6,5-10,3)	9,4 (3,7-15,2)		4,3 (-4,0-12,7)	7,8 (6,1-9,5)
Utbildning					
Kort	7,6 (6,0-9,1)	1,0 (-0,4-2,4)		5,9 (-0,2-12,0)	5,9 (4,7-7,2)
Mellanlång	4,8 (3,1-6,5)	0,0 (0,0-0,0)		0 (0,0-0,0)	3,4 (2,1-4,8)
Lång	3,3 (0,8-5,7)	16,8 (3,4-30,2)		0 (0,0-0,0)	3,5 (1,1-5,8)
Stockholm	N=4113	N=628	N=117	N=644	
Totalt	5,4 (4,7-6,1)	8,3 (6,1-10,5)	8,6 (3,5-13,7)	8,5 (6,3-10,7)*	6,9 (6,3-7,5)
Män	4,8 (3,8-5,8)	5,5 (3,0-8,0)	9,4 (2,3-16,5)	7,7 (4,9-10,5)	5,9 (5,0-6,5)
Kvinnor	5,8 (4,8-6,8)	11,2 (7,6-14,8)*	7,6 (n≤5)	9,5 (6,2-12,8)	7,9 (7,0-8,8)
18-29 år	2,0 (0,9-3,1)	3,6 (0,5-6,7)	3,2 (-2,9-9,3)	4,2 (1,2-7,2)	3,3 (2,2-4,5)
30-44 år	4,6 (3,4-5,8)	5,5 (2,5-8,5)	5,7 (-0,6-11,9)	7,3 (4,0-10,7)	5,8 (4,7-7,0)
45-64 år	6,4 (5,2-7,6)	11,5 (7,1-16,0)	14,3 (1,8-26,8)	12,4 (7,2-17,6)	8,9 (7,6-10,1)
65-84 år	6,9 (5,2-8,6)	16,0 (8,2-23,9)	40,0 (-2,9-82,9)	13,0 (6,2-19,9)	10,0 (8,1-11,8)
Utbildning					
Kort	7,5 (6,2-8,8)	9,6 (5,9-13,3)	11,3 (3,4-19,2)	9,6 (6,3-12,9)	8,9 (7,7-10,1)
Mellanlång	3,8 (2,8-4,9)	7,4 (4,0-10,7)	6,7 (-2,1-15,4)	4,5 (1,6-7,3)	4,8 (3,9-5,8)
Lång	2,9 (1,8-4,0)	3,5 (0,2-6,8)	0,0 (n≤5)	8,6 (2,5-14,8)	3,6 (2,5-4,7)
Göteborg⁴	N=1049	N=224		N=181	
Totalt	3,5 (2,4-4,6)	4,9 (2,1-7,7)		6,1 (2,6-9,6)	3,9 (2,9-4,9)
Män	2,9 (1,4-4,4)	4,2 (n≤5)		2,0 (n≤5)	3,0 (1,7-4,3)
Kvinnor	4,0 (2,4-5,6)	5,8 (1,3-10,3)		10,8 (4,1-17,5)	4,9 (3,3-6,5)
16-29 år	0,5 (-0,5-1,4)	1,7 (-1,6-5,0)		3,3 (-1,2-7,9)	1,2 (0,0-2,3)
30-44 år	1,3 (0,0-2,6)	3,8 (-0,4-8,0)		5,6 (-0,6-11,7)	2,2 (0,8-3,6)
45-64 år	5,3 (3,0-7,6)	6,5 (0,5-12,4)		4,3 (-1,5-10,0)	5,4 (3,3-7,4)
65-84 år	6,9 (3,3-10,5)	12,5 (-0,7-25,7)		20,0 (2,9-37,1)	9,8 (6,0-13,5)
Utbildning					
Kort	6,3 (3,5-9,0)	13,2 (5,2-21,2)		9,3 (1,6-16,9)	7,2 (4,7-9,7)
Mellanlång	3,3 (1,7-4,9)	0,0 (0,0-0,0)		3,6 (-0,4-7,5)	2,5 (1,4-3,7)
Lång	1,1 (-0,1-2,3)	3,8 (-1,2-8,9)		7,0 (-0,6-14,6)	2,4 (0,9-4,0)

³ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

⁴ I Göteborgs enkät har frågan andra svarsalternativ än i Stockholm och Norrlandsenkäterna. Det är 5 svarsalternativ och bara ett av alternativen innebär dålig hälsa, svarsalternativen är: Utmärkt, Mycket god, God, Någorlunda och Dålig.

Tabell 6b. Andel(procent) med **dålig hälsa** vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, webbenkät och vid telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid webbenkät, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Stockholm 2006, totalt	N=3318 5,5 (4,7-6,2)	N=500 9,2 (6,6-11,7)*	N=304 6,4 (3,6-9,2)	N=733 3,9 (2,4-5,3)	N=356 6,5 (3,9-9,1)	N=5211 6,0 (5,3-6,7)
Män	5,3 (4,1-6,5)	8,8 (5,2-12,4)	7,9 (3,1-12,6)	3,0 (1,4-4,6)	2,9 (0,6-5,3)	5,5 (4,6-6,4)
Kvinnor	5,6 (4,5-6,6)	9,5 (5,9-13,1)	5,3 (1,9-8,8)	5,2 (2,6-7,7)	11,3 (6,2-16,5)	6,5 (5,6-7,4)
18-29 år	3,1 (1,4-4,7)	3,4 (-0,4-7,1)	0 (0,0-0,0)	3,0 (0,6-5,4)	2,8 (-0,3-5,9)	3,1 (1,9-4,2)
30-44 år	3,0 (1,8-4,1)	4,6 (1,3-7,9)	7,5 (2,6-12,5)	3,5 (1,4-5,7)	3,1 (0,1-6,2)	4,2 (3,2-5,2)
45-64 år	6,1 (4,8-7,4)	14,9 (9,6-20,1)*	9,4 (3,2-15,6)	3,8 (1,2-6,4)	10,8 (4,2-17,5)	7,9 (6,6-9,1)
65-84 år	8,6 (6,6-10,6)	11,8 (4,7-19,0)	7,3 (-0,5-15,1)	10,8 (0,8-20,8)	18,4 (6,3-30,6)	9,9 (8,0-11,8)
Utbildning						
Kort	7,5 (6,0-9,0)	13,1 (8,3-18,0)	7,4 (2,6-12,2)	4,4 (1,6-7,2)	8,0 (3,8-12,2)	8,2 (7,0-9,5)
Mellanlång	3,7 (2,6-4,9)	6,1 (2,5-9,8)	6,8 (2,0-11,6)	3,5 (1,4-5,6)	3,6 (0,1-7,1)	4,3 (3,4-5,3)
Lång	2,9 (1,7-4,0)	6,1 (1,4-10,7)	5,4 (-0,5-11,3)	3,4 (1,0-5,9)	5,0 (-0,5-10,5)	3,4 (2,4-4,4)

Dagar med god kroppslig hälsa

Tabell 7. Andel(procent) dagar med god kroppslig hälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick	Efter andra utskick	Efter telefonintervju, %	Kalibrerat
Norrland	N=2224	N=2582	N=2685	
Totalt	78,5 (77,1-80,0)	79,4 (78,1-80,7)	79,4 (78,2-80,7)	81,2 (80,0-82,4)
Män	79,2 (77,1-81,3)	80,6 (78,8-82,5)	80,5 (78,7-82,4)	82,9 (81,2-84,7)
Kvinnor	78,0 (76,0-79,9)	78,2 (76,4-80,0)	78,4 (76,7-80,2)	79,3 (77,6-81,1)
16-29 år	84,9 (83,1-86,7)	82,5 (79,1-85,9)	85,6 (84,1-87,1)	86,2 (84,8-87,7)
30-44 år	81,5 (77,7-85,4)	82,5 (79,1-85,9)	82,8 (79,5-86,2)	84,9 (81,7-88,0)
45-64 år	75,9 (72,5-79,2)	76,6 (73,5-79,7)	76,4 (73,4-79,5)	77,8 (74,8-80,8)
65-84 år	75,4 (72,8-78,0)	75,8 (73,3-78,3)	75,8 (73,3-78,2)	75,9 (73,5-78,3)
Utbildning				
Kort	76,6 (74,5-78,7)	77,9 (76,0-79,8)	77,8 (75,9-79,6)	80,1 (78,3-81,8)
Mellanlång	79,6 (76,9-82,3)	80,3 (77,9-82,8)	80,9 (78,6-83,3)	82,1 (79,8-84,4)
Lång	86,9 (83,2-90,6)	86,6 (83,2-90,1)	86,7 (83,3-90,2)	85,8 (82,3-89,2)
Göteborg	N=1070	N=1298	N=1480	
Totalt	82,9 (81,2-84,7)	82,6 (81,0-84,2)	82,2 (80,7-83,7)	82,2 (80,7-83,7)
Män	85,7 (83,2-88,1)	85,1 (82,9-87,3)	84,8 (82,7-86,8)	84,6 (82,5-86,7)
Kvinnor	80,6 (78,1-83,1)	80,3 (78,0-82,6)	79,8 (77,6-82,0)	79,6 (77,4-81,8)
16-29 år	88,2 (85,5-90,8)	87,3 (84,9-89,8)	87,0 (84,7-89,3)	85,8 (83,3-88,4)
30-44 år	86,7 (84,0-89,4)	86,8 (84,5-89,1)	85,7 (83,4-88,0)	85,6 (83,3-88,0)
45-64 år	80,2 (76,8-83,5)	79,2 (76,0-82,4)	79,5 (76,5-82,5)	79,0 (76,0-82,0)
65-84 år	76,0 (70,5-81,4)	75,3 (70,1-80,4)	74,1 (69,1-79,0)	74,1 (69,0-79,1)
Utbildning				
Kort	75,9 (72,0-79,9)	75,4 (71,8-79,0)	75,6 (72,3-78,9)	75,6 (72,3-78,9)
Mellanlång	82,9 (80,3-85,5)	83,0 (80,7-85,4)	82,7 (80,5-84,9)	83,3 (81,1-85,4)
Lång	90,0 (87,5-92,4)	89,1 (86,6-91,5)	88,3 (85,9-90,7)	88,0 (85,5-90,4)

Tabell 8. Andel dagar med god kroppslig hälsa vid första utskick, andra utskick och i telefonintervjun.

	Vid första utskick, %	Vid andra utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt (Kalibrerat), %
Norrland	N=2224	N=358	N=103	
Totalt	78,5 (77,1-80,0)	84,7 (81,7-87,7)*	81,3 (74,9-87,7)	81,2 (80,0-82,4)
Män	79,2 (77,1-81,3)	88,1 (84,7-91,4)*	78,3 (68,6-88,0)	82,9 (81,2-84,7)
Kvinnor	78,0 (76,0-79,9)	80,1 (74,9-85,4)	85,9 (78,2-93,6)	79,3 (77,6-81,1)
16-29 år	84,9 (83,1-86,7)	88,2 (85,2-91,2)	87,4 (79,9-94,9)	86,2 (84,8-87,7)
30-44 år	81,5 (77,7-85,4)	87,4 (80,2-94,7)	88,4 (75,6-101,3)	84,9 (81,7-88,0)
45-64 år	75,9 (72,5-79,2)	82,2 (73,8-90,6)	69,8 (45,6-93,9)	77,8 (74,8-80,8)
65-84 år	75,4 (72,8-78,0)	79,7 (72,4-87,1)	73,6 (57,0-90,3)	75,9 (73,5-78,3)
Utbildning				
Kort	76,6 (74,5-78,7)	85,0 (81,0-89,0)*	75,1 (65,5-84,7)	80,1 (78,3-81,8)
Mellanlång	79,6 (76,9-82,3)	85,9 (80,8-91,1)	97,0 (93,8-100,2)*	82,1 (79,8-84,4)
Lång	86,9 (83,2-90,6)	84,9 (73,7-96,2)	94,0 (82,4-105,6)	85,8 (82,3-89,2)
Göteborg	N=1070	N=228	N=182	
Totalt	82,9 (81,2-84,7)	80,9 (76,9-84,8)	79,8 (75,2-84,4)	82,2 (80,7-83,7)
Män	85,7 (83,2-88,1)	82,8 (77,5-88,1)	83,0 (77,0-88,9)	84,6 (82,5-86,7)
Kvinnor	80,6 (78,1-83,1)	78,5 (72,6-84,5)	76,0 (68,9-83,2)	79,6 (77,4-81,8)
16-29 år	88,2 (85,5-90,8)	84,5 (78,4-90,5)	85,6 (79,3-91,8)	85,8 (83,3-88,4)
30-44 år	86,7 (84,0-89,4)	87,0 (82,5-91,4)	78,3 (69,0-87,6)	85,6 (83,3-88,0)
45-64 år	80,2 (76,8-83,5)	73,8 (64,0-83,6)	81,6 (72,6-90,5)	79,0 (76,0-82,0)
65-84 år	76,0 (70,5-81,4)	70,0 (52,4-87,6)	63,2 (45,1-81,2)	74,1 (69,0-79,1)
Utbildning				
Kort	75,9 (72,0-79,9)	73,1 (64,3-81,9)	76,7 (67,7-85,7)	75,6 (72,3-78,9)
Mellanlång	82,9 (80,3-85,5)	83,8 (78,9-88,8)	80,6 (74,0-87,3)	83,3 (81,1-85,4)
Lång	90,0 (87,5-92,4)	84,4 (76,4-92,5)	82,1 (72,7-91,4)	88,0 (85,5-90,4)

Fetma

Tabell 9a. Andel(procent) med **fetma (BMI \geq 30)** efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick	Efter andra, tredje ⁵ utskick	Efter fjärde utskick	Efter telefonintervju, %	Kalibrerat
Norrland	N=2224	N=2582		N=2685	
Totalt	13,0(11,6-14,4)	12,7(11,4-14,0)	-	12,5(11,3-13,7)	10,8(9,6-12,0)
Män	12,5(10,6-14,4)	12,4(10,6-14,2)	-	12,0(10,3-13,7)	11,8(10,1-13,5)
Kvinnor	13,5(11,6-15,4)	13,0(11,2-14,8)	-	13,0(11,3-14,7)	9,7(8,0-11,4)
16-29 år	8,6(6,5-10,7)	7,9(6,1-9,8)	-	8,0(6,2-9,9)	6,3(4,7-7,9)
30-44 år	16,5(11,8-21,3)	15,3(11,1-19,5)	-	14,7(10,7-18,8)	10,9(7,4-14,5)
45-64 år	12,6(9,7-15,6)	12,8(10,1-15,6)	-	12,5(9,8-15,2)	12,3(9,6-15,0)
65-84 år	14,2(11,8-16,5)	14,3(12,1-16,6)	-	14,3(12,1-16,5)	13,9(11,7-16,1)
Utbildning					
Kort	14,0(12,0-16,1)	13,8(12,0-15,7)	-	13,6(11,8-15,4)	11,0(9,3-12,6)
Mellanlång	13,3(10,6-16,1)	13,2(10,7-15,8)	-	12,8 (10,3-15,2)	11,9(9,6-14,3)
Lång	9,6(5,5-13,6)	8,4(4,8-12,0)	-	8,3 (4,7-11,8)	7,8(4,3-11,2)
Stockholm	N=4173	N=4814	N=4934	N=5579	
Totalt	9,7(8,8-10,6)	9,6(8,8-10,4)	9,5(8,7-10,3)	9,6(8,8-10,4)	9,5(8,7-10,3)
Män	10,7(9,3-12,1)	10,2(8,9-11,5)	10,2(8,9-11,5)	10,2(9,0-11,4)	9,6(8,4-10,8)
Kvinnor	8,8(7,6-10,0)	9,0 (7,9-10,1)	9,0(7,9-10,1)	9,0 (8,0-10,0)	9,3(8,3-10,3)
18-29 år	4,4(2,8-6,0)	4,6(3,1-6,0)	4,4(2,9-5,8)	4,4(3,1-5,7)	4,6(3,3-5,9)
30-44 år	7,8(6,2-9,3)	7,8(6,4-9,2)	7,9(6,5-9,3)	8,0 (6,7-9,3)	7,9(6,6-9,2)
45-64 år	12,3(10,6-13,9)	12,4(10,9-13,9)	12,4(10,9-13,9)	12,8(11,3-14,2)	13,5(12,0-15,0)
65-84 år	11,3(9,1-13,4)	10,9(8,9-12,9)	10,8(8,8-12,9)	10,8(8,9-12,8)	11,0(9,1-13,0)
Utbildning					
Kort	13,4(11,8-15,1)	13,0(11,5-14,6)	12,9(11,4-14,4)	12,8(11,4-14,2)	12,2(10,9-13,6)
Mellanlång	8,6(7,1-10,1)	8,8(7,4-10,2)	8,7(7,3-10,0)	8,5 (7,3-9,8)	8,1(6,9-9,4)
Lång	5,2(3,8-6,6)	5,1(3,8-6,5)	5,1(3,8-6,4)	5,3 (4,0-6,6)	5,4(4,1-6,7)
Göteborg	N=1070	N=1298		N=1480	
Totalt	9,1(7,4-10,8)	9,6(8,0-11,2)	-	9,5(8,0-11,0)	8,5(7,0-10,0)
Män	8,1(5,7-10,5)	8,7(6,4-11,0)	-	9,0 (6,9-11,1)	8,0(5,9-10,1)
Kvinnor	10,0(7,5-12,5)	10,3(8,0-12,6)	-	9,9 (7,8-12,0)	9,0(6,9-11,1)
16-29 år	3,5(1,0-6,0)	2,7(0,8-4,7)	-	3,4 (1,5-5,4)	3,4(1,4-5,4)
30-44 år	8,2(5,1-11,3)	9,4(6,5-12,3)	-	9,8 (7,1-12,6)	8,7(6,1-11,4)
45-64 år	11,2(7,9-14,4)	12,3(9,2-15,4)	-	11,8(8,9-14,6)	11,5(8,6-14,4)
65-84 år	12,8(8,1-17,5)	12,9(8,4-17,3)	-	12,6(8,4-16,8)	10,9(6,9-14,8)
Utbildning					
Kort	10,8(7,3-14,3)	10,8(7,6-14,0)	-	10,1(7,2-13,0)	8,8(6,1-11,5)
Mellanlång	10,7(7,9-13,4)	11,0(8,5-13,5)	-	11,2(8,9-13,6)	10,2(7,9-12,4)
Lång	4,7(2,2-7,2)	5,7(3,2-8,2)	-	5,6 (3,3-8,0)	5,0(2,8-7,1)

⁵ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 9b. Andel(procent) med *fetma* efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, webbenkät och vid telefonintervju.

	Efter första utskick	Efter andra, tredje utskick	Efter fjärde utskick	Efter webbenkät	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat (%)
Stockholm 2006, totalt	N=3246 9,2 (8,2-10,2)	N=3729 9,4 (8,5-10,4)	N=4028 9,5 (8,6-10,4)	N=4756 9,3 (8,4-10,1)	N=5097 9,2 (8,4-10,0)	N=5097 9,0 (8,2-9,8)
Män	9,8 (8,2-11,4)	9,9 (8,4-11,3)	9,9 (8,5-11,3)	9,7 (8,4-10,9)	9,5 (8,3-10,6)	9,4 (8,2-10,6)
Kvinnor	8,8 (7,5-10,1)	9,1 (7,9-10,3)	9,3 (8,1-10,5)	8,9 (7,8-10,0)	9,0 (7,9-10,1)	8,6 (7,5-9,7)
18-29 år	4,5 (2,5-6,5)	4,4 (2,6-6,1)	4,4 (2,7-6,1)	3,7 (2,3-5,0)	3,4 (2,2-4,6)	3,7 (2,5-4,9)
30-44 år	6,9 (5,2-8,6)	7,3 (5,7-8,9)	7,4 (5,8-8,9)	7,6 (6,2-9,0)	7,7 (6,4-9,1)	7,7 (6,4-9,0)
45-64 år	10,5 (8,8-12,2)	10,9 (9,3-12,5)	11,0 (9,5-12,6)	11,2 (9,7-12,7)	11,5 (10,1-13,0)	12,1 (10,6-13,6)
65-84 år	12,3 (10,0-14,7)	12,7 (10,4-15,0)	13,1 (10,9-15,4)	12,9 (10,7-15,1)	12,5 (10,4-14,6)	12,4 (10,3-14,5)
Utbildning						
Kort	11,0 (9,2-12,8)	11,8 (10,1-13,5)	12,1 (10,5-13,8)	12,0 (10,4-13,5)	12,1 (10,6-13,6)	11,4 (10,0-12,9)
Mellanlång	10,1 (8,3-11,9)	9,5 (7,8-11,1)	9,4 (7,8-10,9)	8,9 (7,5-10,3)	8,7 (7,4-10,0)	8,5 (7,2-9,8)
Lång	4,8 (3,3-6,4)	5,1 (3,6-6,5)	5,0 (3,6-6,4)	5,1 (3,8-6,3)	5,0 (3,8-6,2)	4,5 (3,3-5,6)

Tabell 10a. Andel med fetma (BMI \geq 30) vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och i telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje ⁶ utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt (Kalibrerat), %
Norrland Totalt	N=2224 13,0 (11,6-14,4)	N=358 3,9 (0,8-7,0)*		N=103 2,9 (-2,1-7,9)	N=2685 10,8 (9,6-12,0)
Män	12,5 (10,6-14,4)	0,9 (-3,2-5,2)		5,4 (n<5)	11,8 (10,1-13,5)
Kvinnor	13,5 (11,6-15,4)	7,1 (2,5-11,7)		0 (-9,7-9,7)	9,7 (8,0-11,4)
16-29 år	8,6 (6,5-10,7)	4,8 (1,3-8,2)		9,7 (1,4-18,0)	6,3 (4,7-7,9)
30-44 år	16,5 (11,8-21,3)	8,9 (0,8-17,0)		5,9 (-5,3-17,1)	10,9 (7,4-14,5)
45-64 år	12,6 (9,7-15,6)	14,5 (5,9-23,1)		0,0 (0,0-0,0)	12,3 (9,6-15,0)
65-84 år	14,2 (11,8-16,5)	15,7 (8,6-22,9)		13,0 (-0,7-26,8)	13,9 (11,7-16,1)
Utbildning					
Kort	14,0 (12,0-16,1)	12,7 (8,1-17,4)		9,3 (1,8-16,8)	11,0 (9,3-12,6)
Mellanlång	13,3 (10,6-16,1)	12,5 (5,8-19,3)		0 (0,0-0,0)	11,9 (9,6-14,3)
Lång	9,6 (5,5-13,6)	0,0 (0,0-0,0)		0 (0,0-0,0)	7,8 (4,3-11,2)
Stockholm Totalt	N=4173 9,7 (8,8-10,6)	N=641 9,0 (6,7-11,3)	N=120 7,6 (2,8-12,4)	N=645 9,8 (7,6-12,1)	N=5579 9,5 (8,7-10,3)
Män	10,7 (9,3-12,1)	7,6 (4,7-10,5)	9,2 (2,2-16,2)	10,2 (7,0-13,4)	9,6 (8,4-10,8)
Kvinnor	8,8 (7,6-10,0)	10,7 (7,2-14,2)	5,6 (n<5)	9,3 (5,9-12,7)	9,3 (8,3-10,3)
18-29 år	4,4 (2,8-6,0)	5,1 (1,5-8,8)	0,0 (0,0-0,0)	4,3 (1,3-7,4)	4,6 (3,3-5,9)
30-44 år	7,8 (6,2-9,3)	7,9 (4,3-11,4)	11,5 (2,9-20,1)	8,2 (4,7-11,8)	7,9 (6,6-9,2)
45-64 år	12,3 (10,6-13,9)	13,7 (8,9-18,5)	10,0 (-0,7-20,7)	17,4 (11,4-23,5)	13,5 (12,0-15,0)
65-84 år	11,3 (9,1-13,4)	7,7 (2,0-13,4)	0,0 (0,0-0,0)	10,8 (4,5-17,2)	11,0 (9,1-13,0)
Utbildning					
Kort	13,4 (11,8-15,1)	10,2 (6,4-14,0)	9,8 (2,4-17,2)	12,3 (8,6-16,0)	12,2 (10,9-13,6)
Mellanlång	8,6 (7,1-10,1)	9,7 (5,9-13,5)	3,2 (-3,0-9,4)	7,6 (3,9-11,3)	8,1 (6,9-9,4)
Lång	5,2 (3,8-6,6)	4,3 (0,7-8,0)	4,8 (-4,3-13,9)	7,5 (1,8-13,2)	5,4 (4,1-6,7)
Göteborg Totalt	N=1070 9,1 (7,4-10,8)	N=228 11,7 (7,5-15,9)		N=182 8,9 (4,7-13,1)	N=1480 8,5 (7,0-10,0)
Män	8,1 (5,7-10,5)	11,0 (5,3-16,7)		11,1 (4,9-17,3)	8,0 (5,9-10,1)
Kvinnor	10,0 (7,5-12,5)	12,4 (6,1-18,7)		6,3 (1,0-11,6)	9,0 (6,9-11,1)
16-29 år	3,5 (1,0-6,0)	0,0 (0,0-0,0)		6,7 (0,4-13,0)	3,4 (1,4-5,4)
30-44 år	8,2 (5,1-11,3)	14,1 (6,5-21,7)		13,0 (4,0-21,9)	8,7 (6,1-11,4)
45-64 år	11,2 (7,9-14,4)	18,5 (9,0-27,9)		6,7 (-0,5-13,8)	11,5 (8,6-14,4)
65-84 år	12,8 (8,1-17,5)	13,6 (-0,1-27,4)		10,0 (-2,8-22,8)	10,9 (6,9-14,8)
Utbildning					
Kort	10,8 (7,3-14,3)	10,8 (3,5-18,1)		5,7 (-0,4-11,8)	8,8 (6,1-11,5)
Mellanlång	10,7 (7,9-13,4)	12,5 (6,1-18,9)		13,1 (5,9-20,3)	10,2 (7,9-12,4)
Lång	4,7 (2,2-7,2)	11,1 (2,8-19,4)		4,8 (-1,6-11,1)	5,0 (2,8-7,1)

⁶ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 10b. Andel(procent) med *fetma* vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, vid webbenkät och vid telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid webbenkät, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Stockholm 2006, totalt	N=3246 9,2 (8,2-10,2)	N=483 11,0 (8,2-13,8)	N=299 10,7 (7,2-14,2)	N=728 7,7 (5,8-9,6)	N=341 8,5 (5,5-11,5)	N=5097 9,0 (8,2-9,8)
Män	9,8 (8,2-11,4)	10,1 (6,3-14,0)	10,2 (4,9-15,5)	8,9 (6,2-11,6)	7,0 (3,4-10,5)	9,4 (8,2-10,6)
Kvinnor	8,8 (7,5-10,1)	11,8 (7,7-15,8)	11,1 (6,4-15,9)	5,9 (3,1-8,6)	10,7 (5,5-15,9)	8,6 (7,5-9,7)
18-29 år	4,5 (2,5-6,5)	3,5 (-0,3-7,4)	4,6 (-0,4-9,6)	1,5 (-0,2-3,2)	1,9 (-0,7-4,5)	3,7 (2,5-4,9)
30-44 år	6,9 (5,2-8,6)	9,3 (4,7-13,9)	8,4 (3,2-13,6)	8,5 (5,2-11,7)	9,1 (4,1-14,1)	7,7 (6,4-9,0)
45-64 år	10,5 (8,8-12,2)	13,9 (8,8-19,0)	12,9 (5,8-20,0)	12,4 (7,9-16,8)	18,5 (10,2-26,9)	12,1 (10,6-13,6)
65-84 år	12,3 (10,0-14,7)	16,2 (8,1-24,3)	12,3 (9,2-33,7)	8,1 (-0,7-16,9)	2,9 (-2,4-8,2)	12,4 (10,3-14,5)
Utbildning						
Kort	11,0 (9,2-12,8)	16,9 (11,5-22,2)	15,9 (9,2-22,7)	10,8 (6,6-15,1)	13,4 (8,1-18,6)	11,4 (10,0-12,9)
Mellanlång	10,1 (8,3-11,9)	5,6 (2,1-9,1)	8,0 (2,8-13,2)	6,6 (3,8-9,5)	5,7 (1,4-10,1)	8,5 (7,2-9,8)
Lång	4,8 (3,3-6,4)	7,0 (2,0-12,0)	3,6 (-1,3-8,4)	5,4 (2,3-8,4)	3,4 (-1,2-8,1)	4,5 (3,3-5,6)

Tandhälsa

Tabell 11. Andel (procent) med dålig tandhälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervjun.

	Efter första utskick, %	Efter andra utskick, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2224	N=2582	N=2685	N=2685
Totalt	8,8 (7,6-10,0)	8,9 (7,8-10,0)	8,8 (7,7-9,9)	8,8 (7,7-9,9)
Män	10,7 (8,8-12,6)	10,9 (9,2-12,6)	10,6 (8,9-12,3)	11,3 (9,6-13,0)
Kvinnor	7,1 (5,7-8,5)	7,1 (5,8-8,4)	7,0 (5,7-8,3)	6,2 (4,9-7,5)
16-29 år	5,9 (4,1-7,7)	6,1 (4,4-7,7)	5,9 (4,3-7,5)	7,6 (5,9-9,4)
30-44 år	7,4 (4,1-10,8)	8,3 (5,1-11,6)	7,8 (4,8-10,9)	6,2 (3,4-8,9)
45-64 år	10,2 (7,5-12,8)	10,1 (7,6-12,6)	10,0 (7,6-12,5)	10,8 (8,3-13,4)
65-84 år	9,6 (7,6-11,6)	9,7 (7,8-11,6)	9,9 (8,0-11,8)	9,3 (7,4-11,1)
Utbildning				
Kort	9,9 (8,2-11,7)	10,1 (8,4-11,7)	9,8 (8,3-11,4)	11,0 (9,4-12,7)
Mellanlång	7,5 (5,4-9,7)	7,9 (5,9-10,0)	7,8 (5,8-9,7)	7,3 (5,4-9,3)
Lång	5,4 (2,2-8,5)	5,2 (2,3-8,1)	5,2 (2,3-8,0)	3,5 (1,2-5,9)
Göteborg	N=1070	N=1298	N=1480	
Totalt	9,3 (7,5-11,1)	10,0 (8,4-11,6)	10,1 (8,6-11,6)	10,0 (8,5-11,5)
Män	10,2 (7,5-12,9)	10,5 (8,0-13,0)	10,4 (8,1-12,7)	10,4 (8,1-12,7)
Kvinnor	8,6 (6,3-10,9)	9,6 (7,4-11,8)	9,7 (7,6-11,8)	9,7 (7,6-11,8)
16-29 år	4,9 (1,9-7,8)	7,2 (4,1-10,3)	7,1 (4,3-9,9)	7,3 (4,4-10,1)
30-44 år	7,6 (4,6-10,5)	8,6 (5,8-11,4)	8,9 (6,2-11,6)	8,7 (6,1-11,3)
45-64 år	12,4 (9,0-15,8)	12,4 (9,3-15,6)	12,7 (9,7-15,7)	12,4 (9,5-15,4)
65-84 år	11,1 (6,6-15,5)	11,2 (7,0-15,4)	11,1 (7,1-15,0)	13,2 (8,9-17,4)
Utbildning				
Kort	10,3 (6,8-13,8)	12,8 (9,4-16,2)	12,1 (9,0-15,2)	11,7 (8,6-14,7)
Mellanlång	11,8 (8,9-14,6)	11,6 (9,0-14,1)	11,9 (9,5-14,3)	11,9 (9,5-14,4)
Lång	4,0 (1,7-6,2)	4,2 (2,1-6,4)	4,5 (2,4-6,6)	4,5 (2,4-6,6)

Tabell 12. Andel med dålig tandhälsa vid första utskick, andra utskick och i telefonintervjun.

	Vid första utskick, %	Vid andra utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2224	N=358	N=103	N=2685
Totalt	8,8 (7,6-10,0)	9,8 (6,8-12,8)	5,1 (0,2-10,0)	8,8 (7,7-9,9)
Män	10,7 (8,8-12,6)	11,7 (7,3-16,1)	5,8 (n≤5)	11,3 (9,6-13,0)
Kvinnor	7,1 (5,7-8,5)	7,4 (3,5-11,3)	4,1 (n≤5)	6,2 (4,9-7,5)
16-29 år	5,9 (4,1-7,7)	6,7 (2,7-10,7)	3,1 (-1,7-8,0)	7,6 (5,9-9,4)
30-44 år	7,4 (4,1-10,8)	12,8 (3,2-22,3)	0,0 (0,0-0,0)	6,2 (3,4-8,9)
45-64 år	10,2 (7,5-12,8)	9,5 (2,3-16,7)	7,1 (-6,3-20,6)	10,8 (8,3-13,4)
65-84 år	9,6 (7,6-11,6)	10,4 (4,4-16,4)	17,4 (1,9-32,9)	9,3 (7,4-11,1)
Utbildning				
Kort	9,9 (8,2-11,7)	10,9 (6,5-15,2)	4,8 (-0,7-10,3)	11,0 (9,4-12,7)
Mellanlång	7,5 (5,4-9,7)	11,0 (4,6-17,4)	3,6 (-3,3-10,5)	7,3 (5,4-9,3)
Lång	5,4 (2,2-8,5)	4,4 (-2,9-11,8)	0,0 (0,0-0,0)	3,5 (1,2-5,9)
Göteborg	N=1070	N=228	N=182	
Totalt	9,3 (7,5-11,1)	13,3 (8,9-17,7)	10,4 (6,0-14,8)	10,0 (8,5-11,5)
Män	10,2 (7,5-12,9)	11,8 (6,0-17,6)	10,1 (4,2-16,0)	10,4 (8,1-12,7)
Kvinnor	8,6 (6,3-10,9)	15,0 (8,2-21,8)	10,8 (4,1-17,5)	9,7 (7,6-11,8)
16-29 år	4,9 (1,9-7,8)	15,5 (6,3-24,8)	6,7 (0,4-13,0)	7,3 (4,4-10,1)
30-44 år	7,6 (4,6-10,5)	12,5 (5,3-19,7)	11,1 (2,7-19,5)	8,7 (6,1-11,3)
45-64 år	12,4 (9,0-15,8)	12,5 (4,5-20,5)	14,9 (4,7-25,1)	12,4 (9,5-15,4)
65-84 år	11,1 (6,6-15,5)	12,5 (-0,7-25,7)	9,5 (-3,0-22,1)	13,2 (8,9-17,4)
Utbildning				
Kort	10,3 (6,8-13,8)	23,5 (13,5-33,5)	7,3 (0,4-14,1)	11,7 (8,6-14,7)
Mellanlång	11,8 (8,9-14,6)	10,7 (4,7-16,6)	14,3 (6,8-21,8)	11,9 (9,5-14,4)
Lång	4,0 (1,7-6,2)	5,5 (-0,5-11,5)	7,0 (-0,6-14,6)	4,5 (2,4-6,6)

Psykisk hälsa (Dagar med god psykisk hälsa)

Tabell 13. Andel (procent) dagar med god psykisk hälsa efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick, %	Efter andra utskick, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2224	N=2582	N=2685	N=2685
Totalt	85,0 (83,8-86,2)	85,4 (84,3-86,5)	85,7 (84,7-86,8)	87,4 (86,5-88,4)
Män	87,0 (85,3-88,6)	87,8 (86,3-89,3)	88,0 (86,5-89,5)	89,8 (88,5-91,1)
Kvinnor	83,3 (81,7-84,9)	83,2 (81,7-84,7)	83,6 (82,1-85,1)	84,8 (83,4-86,2)
16-29 år	83,7 (81,8-85,6)	84,0 (82,4-85,7)	84,8 (83,2-86,4)	83,8 (82,2-85,5)
30-44 år	84,4 (80,8-87,9)	85,0 (81,9-88,2)	85,5 (82,5-88,5)	88,9 (86,2-91,6)
45-64 år	84,9 (82,4-87,4)	85,3 (83,0-87,6)	85,5 (83,2-87,8)	88,5 (86,5-90,4)
65-84 år	87,2 (85,1-89,3)	87,4 (85,5-89,4)	87,4 (85,5-89,4)	88,1 (86,3-90,0)
Utbildning				
Kort	84,9 (83,2-86,6)	85,6 (84,1-87,1)	85,9 (84,4-87,4)	87,3 (86,0-88,7)
Mellanlång	83,6 (81,4-85,8)	84,2 (82,2-86,2)	84,8 (82,9-86,7)	87,1 (85,4-88,9)
Lång	89,3 (86,3-92,4)	87,9 (84,9-91,0)	88,0 (85,0-91,0)	88,9 (86,1-91,7)
Göteborg	N=1070	N=1298	N=1480	
Totalt	83,8 (82,2-85,4)	83,5 (82,0-85,0)	84,1 (82,7-85,5)	83,8 (82,4-85,2)
Män	86,8 (84,6-89,1)	86,8 (84,8-88,8)	87,6 (85,8-89,4)	86,7 (84,8-88,5)
Kvinnor	81,2 (78,9-83,5)	80,5 (78,3-82,7)	80,8 (78,8-82,9)	80,5 (78,5-82,6)
16-29 år	85,6 (82,9-88,4)	84,1 (81,5-86,8)	85,7 (83,4-88,0)	85,7 (83,4-88,0)
30-44 år	83,1 (80,0-86,1)	83,0 (80,3-85,7)	83,6 (81,0-86,1)	83,8 (81,2-86,3)
45-64 år	83,3 (80,3-86,2)	83,2 (80,5-86,0)	83,3 (80,7-85,8)	82,4 (79,7-85,0)
65-84 år	83,9 (79,4-88,4)	84,0 (79,7-88,2)	84,5 (80,6-88,4)	83,2 (79,2-87,3)
Utbildning				
Kort	81,1 (77,7-84,6)	80,9 (77,7-84,1)	81,8 (78,9-84,7)	81,5 (78,6-84,4)
Mellanlång	82,4 (79,9-85,0)	82,3 (80,0-84,6)	83,0 (81,0-85,1)	82,7 (80,7-84,8)
Lång	88,8 (86,5-91,2)	88,1 (85,8-90,4)	88,4 (86,2-90,6)	88,5 (86,3-90,7)

Tabell 14. Andel dagar med psykiskt god hälsa vid första utskick, andra utskick och i telefonintervjun.

	Vid första utskick, %	Vid andra utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2224	N=358	N=103	N=2685
Totalt	85,0 (83,8-86,2)	87,9 (85,4-90,4)	93,7 (89,9-97,5)*	87,4 (86,5-88,4)
Män	87,0 (85,3-88,6)	92,1 (89,1-95,1)*	92,8 (87,0-98,7)	89,8 (88,5-91,1)
Kvinnor	83,3 (81,7-84,9)	82,5 (78,4-86,5)	95,0 (90,4-99,7)*	84,8 (83,4-86,2)
16-29 år	83,7 (81,8-85,6)	85,5 (82,3-88,7)	97,6 (95,3-99,8)*	83,8 (82,2-85,5)
30-44 år	84,4 (80,8-87,9)	88,6 (82,8-94,4)	93,1 (80,6-105,7)	88,9 (86,2-91,6)
45-64 år	84,9 (82,4-87,4)	88,5 (81,7-95,2)	92,9 (81,7-104,0)	88,5 (86,5-90,4)
65-84 år	87,2 (85,1-89,3)	89,5 (83,9-95,1)	88,2 (77,0-99,4)	88,1 (86,3-90,0)
Utbildning				
Kort	84,9 (83,2-86,6)	89,4 (86,3-92,5)	92,0 (86,2-97,8)	87,3 (86,0-88,7)
Mellanlång	83,6 (81,4-85,8)	88,9 (84,6-93,2)	99,6 (99,0-100,2)*	87,1 (85,4-88,9)
Lång	89,3 (86,3-92,4)	78,4 (67,0-89,8)	95,0 (67,4-122,6)	88,9 (86,1-91,7)
Göteborg	N=1070	N=228	N=182	
Totalt	83,8 (82,2-85,4)	81,8 (78,0-85,6)	88,5 (85,2-91,8)	83,8 (82,4-85,2)
Män	86,8 (84,6-89,1)	86,4 (81,9-91,0)	92,4 (88,7-96,2)	86,7 (84,8-88,5)
Kvinnor	81,2 (78,9-83,5)	76,5 (70,3-82,8)	83,8 (78,1-89,5)	80,5 (78,5-82,6)
16-29 år	85,6 (82,9-88,4)	79,0 (71,9-86,1)	92,3 (88,4-96,2)	85,7 (83,4-88,0)
30-44 år	83,1 (80,0-86,1)	82,6 (76,3-89,0)	87,7 (80,0-95,5)	83,8 (81,2-86,3)
45-64 år	83,3 (80,3-86,2)	82,7 (75,0-90,4)	83,8 (76,2-91,4)	82,4 (79,7-85,0)
65-84 år	83,9 (79,4-88,4)	84,3 (70,0-98,6)	89,5 (81,1-97,9)	83,2 (79,2-87,3)
Utbildning				
Kort	81,1 (77,7-84,6)	79,9 (71,7-88,1)	87,1 (80,2-94,0)	81,5 (78,6-84,4)
Mellanlång	82,4 (79,9-85,0)	81,7 (76,4-86,9)	88,1 (83,7-92,5)	82,7 (80,7-84,8)
Lång	88,8 (86,5-91,2)	84,4 (76,9-91,8)	91,1 (83,8-98,4)	88,5 (86,3-90,7)

Levnadsvanor

Röker dagligen

Tabell 15a. Andel(procent) som röker dagligen efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick, %	Efter andra, tredje ⁷ utskick, %	Efter fjärde utskick, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2198	N=2550		N=2653	N=2653
Totalt	14,3 (13,0-15,6)	14,5 (13,3-15,7)	-	14,5 (13,3-15,7)	15,4 (14,2-16,6)
Män	11,3 (9,5-13,1)	11,6 (10,0-13,2)	-	12,0 (10,4-13,6)	14,8 (13,2-16,4)
Kvinnor	17,0 (15,1-18,9)	17,0 (15,2-18,8)	-	16,9 (15,1-18,7)	16,0 (14,2-17,8)
16-29 år	5,8 (4,0-7,6)	6,1 (4,5-7,7)	-	6,3 (4,7-7,9)	6,7 (5,0-8,3)
30-44 år	16,3 (11,6-21,1)	16,5 (12,2-20,9)	-	16,6 (12,4-20,8)	19,2 (14,7-23,7)
45-64 år	20,0 (16,5-23,5)	20,2 (16,9-23,6)	-	20,4 (17,1-23,7)	19,7 (16,4-23,0)
65-84 år	8,7 (6,8-10,6)	8,7 (6,9-10,5)	-	8,6 (6,8-10,3)	8,5 (6,8-10,3)
Utbildning					
Kort	19,8 (17,5-22,2)	19,8 (17,6-22,0)	-	19,8 (17,7-21,9)	22,7 (20,5-24,9)
Mellanlång	9,4 (7,1-11,8)	9,8 (7,6-12,1)	-	10,1 (7,8-12,3)	9,5 (7,3-11,6)
Lång	7,9 (4,2-11,7)	7,5 (4,1-10,9)	-	7,4 (4,0-10,7)	3,8 (1,4-6,3)
Stockholm	N=4146	N=4782	N=4901	N=5545	
Totalt	15,8 (14,7-16,9)	16,2 (15,1-17,3)	16,4 (15,4-17,4)	17,1 (16,1-18,1)	17,3 (16,3-18,3)
Män	14,4 (12,8-16,0)	14,5 (13,0-16,0)	14,7 (13,2-16,2)	15,5 (14,1-16,6)	15,6 (14,2-17,0)
Kvinnor	16,9 (15,4-18,4)	17,7 (16,2-19,2)	17,8 (16,3-19,3)	18,6 (17,2-20,0)	19,1 (17,7-20,5)
18-29 år	12,2 (9,6-14,7)	12,3 (10,0-14,6)	12,6 (10,3-14,9)	13,3 (11,1-15,4)	13,3 (11,1-15,4)
30-44 år	13,9 (11,9-15,9)	14,9 (13,0-16,7)	15,2 (13,3-17,0)	16,5 (14,7-18,3)	17,0 (15,2-18,8)
45-64 år	20,6 (18,6-22,6)	21,1 (19,2-23,0)	21,2 (19,3-23,1)	21,7 (19,9-23,5)	22,6 (20,8-24,5)
65-84 år	11,8 (9,6-14,0)	12,0 (9,9-14,1)	12,1 (9,9-14,2)	13,0 (10,9-15,0)	12,7 (10,7-14,8)
Utbildning					
Kort	24,2 (22,0-26,3)	24,9 (22,9-26,9)	25,2 (23,2-27,1)	26,1 (24,3-28,0)	26,0 (24,2-27,9)
Mellanlång	12,4 (10,6-14,1)	12,4 (10,7-14,0)	12,4 (10,8-14,0)	13,0 (11,4-14,5)	12,7 (11,1-14,2)
Lång	8,5 (6,6-10,3)	8,8 (7,0-10,5)	8,7 (7,0-10,4)	8,6 (7,0-10,2)	8,6 (6,9-10,2)
Göteborg	N=1058	N=1284		N=1480	
Totalt	16,4 (14,2-18,6)	17,1 (15,0-19,2)	-	17,4 (15,5-19,3)	18,1 (16,2-20,0)
Män	14,3 (11,2-17,4)	15,1 (12,2-18,0)	-	15,7 (13,0-18,4)	15,8 (13,1-18,5)
Kvinnor	18,1 (15,0-21,2)	18,9 (16,0-21,8)	-	19,0 (16,2-21,8)	20,5 (17,7-23,3)
16-29 år	6,3 (3,0-9,7)	10,6 (6,9-14,4)	-	11,8 (8,3-15,3)	12,1 (8,6-15,7)
30-44 år	16,0 (11,9-20,1)	16,6 (12,9-20,3)	-	16,4 (12,9-19,8)	16,6 (13,1-20,1)
45-64 år	24,2 (19,8-28,6)	23,6 (19,6-27,6)	-	24,0 (20,1-27,8)	26,2 (22,2-30,1)
65-84 år	13,1 (8,3-17,8)	13,5 (9,0-18,0)	-	14,1 (9,7-18,5)	15,7 (11,1-20,3)
Utbildning					
Kort	20,7 (16,1-25,3)	20,9 (16,7-25,1)	-	21,3 (17,4-25,2)	21,0 (17,1-24,9)
Mellanlång	18,0 (14,6-21,3)	19,7 (16,5-22,9)	-	20,0 (17,0-23,0)	20,8 (17,8-23,8)
Lång	9,0 (5,6-12,3)	8,4 (5,5-11,4)	-	8,5 (5,7-11,3)	9,4 (6,4-12,3)

⁷ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 15b. Andel(procent) som **röker dagligen** efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, efter webbenkät och efter telefonintervjun.

	Efter första utskick, %	Efter andra, tredje utskick, %	Efter fjärde utskick, %	Efter webbenkät, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Stockholm 2006, totalt	N=3246 13,8 (12,6-15,0)	N=3729 14,4 (13,3-15,5)	N=4028 14,6 (13,5-15,7)	N=4756 14,4 (13,4-15,4)	N=5097 14,8 (13,8-15,7)	N=5097 15,5 (14,5-16,5)
Män	13,3 (11,5-15,1)	14,3 (12,6-16,0)	14,3 (12,7-16,0)	13,8 (12,3-15,2)	14,2 (12,8-15,6)	15,0 (13,6-16,4)
Kvinnor	14,1 (12,6-15,7)	14,5 (13,0-15,9)	14,7 (13,3-16,2)	14,9 (13,5-16,2)	15,3 (13,9-16,6)	16,0 (14,6-17,4)
18-29 år	15,2 (11,8-18,6)	16,9 (13,7-20,1)	16,3 (13,3-19,3)	15,1 (12,6-17,6)	15,8 (13,4-18,2)	15,9 (13,5-18,4)
30-44 år	9,9 (7,9-11,9)	10,4 (8,5-12,2)	10,8 (9,0-12,6)	11,2 (9,5-12,8)	11,5 (9,9-13,1)	12,5 (10,9-14,2)
45-64 år	17,6 (15,5-19,7)	17,9 (15,9-19,9)	18,3 (16,4-20,3)	18,0 (16,2-19,8)	18,5 (16,7-20,2)	19,8 (18,0-21,6)
65-84 år	10,8 (8,6-13,1)	11,5 (9,3-13,7)	11,5 (9,4-13,7)	11,6 (9,6-13,7)	11,9 (9,8-14,0)	12,0 (9,9-14,0)
Utbildning						
Kort	21,5 (19,1-23,9)	22,3 (20,0-24,5)	22,4 (20,3-24,6)	22,3 (20,3-24,4)	23,0 (21,0-24,9)	23,6 (21,6-25,5)
Mellanlång	11,6 (9,7-13,5)	12,4 (10,6-14,3)	12,9 (11,1-14,7)	12,4 (10,8-14,0)	12,5 (10,9-14,1)	12,9 (11,3-14,4)
Lång	7,6 (5,8-9,5)	7,4 (5,6-9,1)	7,2 (5,6-8,9)	7,6 (6,1-9,2)	7,8 (6,2-9,3)	7,3 (5,8-8,8)

Tabell 16a. Andel som röker dagligen vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och i telefonintervjun.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje ⁸ utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt kalibrerat, %
Norrland Totalt	N=2198 14,3 (13,0-15,6)	N=352 15,1 (11,7-18,5)		N=103 16,3 (10,3-22,3)	N=2653 15,4 (14,2-16,6)
Män	11,3 (9,5-13,1)	13,3 (8,9-17,7)		19,2 (10,5-20,5)	14,8 (13,2-16,4)
Kvinnor	17,0 (15,1-18,9)	17,4 (12,1-22,7)		11,8 (n≤5)	16,0 (14,2-17,8)
16-29 år	5,8 (4,0-7,6)	7,4 (3,2-11,7)		9,4 (1,0-17,5)	6,7 (5,0-8,3)
30-44 år	16,3 (11,6-21,1)	17,8 (6,8-28,7)		17,6 (-0,5-35,8)	19,2 (14,7-23,7)
45-64 år	20,0 (16,5-23,5)	21,9 (11,7-32,0)		28,6 (4,9-52,2)	19,7 (16,4-23,0)
65-84 år	8,7 (6,8-10,6)	8,2 (2,8-13,5)		4,3 (-4,0-12,7)	8,5 (6,8-10,3)
Utbildning					
Kort	19,8 (17,5-22,2)	19,7 (14,2-25,3)		19,4 (9,2-29,6)	22,7 (20,5-24,9)
Mellanlång	9,4 (7,1-11,8)	12,9 (6,0-19,7)		16,3 (2,6-30,0)	9,5 (7,3-11,6)
Lång	7,9 (4,2-11,7)	4,4 (-2,9-11,8)		0,0 (0,0-0,0)	3,8 (1,4-6,3)
Stockholm Totalt	N=4146 15,8 (14,7-16,9)	N=636 19,2 (16,1-22,3)	N=119 22,7 (15,2-30,2)	N=644 22,8 (19,6-26,0)*	17,3 (16,3-18,3)
Män	14,4 (12,8-16,0)	15,1 (11,2-19,0)	20,0 (10,3-29,7)	20,7 (16,4-25,0)*	15,6 (14,2-17,0)
Kvinnor	16,9 (15,4-18,4)	23,6 (18,8-28,4)*	25,9 (14,2-37,6)	25,3 (20,4-30,2)*	19,1 (17,7-20,5)
18-29 år	12,2 (9,6-14,7)	12,9 (7,4-18,5)	18,8 (5,2-32,3)	16,8 (11,1-22,4)	13,3 (11,1-15,4)
30-44 år	13,9 (11,9-15,9)	19,6 (14,4-24,9)	23,1 (11,7-34,4)	24,6 (19,0-30,1)*	17,0 (15,2-18,8)
45-64 år	20,6 (18,6-22,6)	25,1 (19,1-31,2)	26,7 (10,8-42,5)	27,5 (20,4-34,5)	22,6 (20,8-24,5)
65-84 år	11,8 (9,6-14,0)	14,5 (6,9-22,0)	20,0 (-15,1-55,1)	21,7 (13,4-30,1)	12,7 (10,7-14,8)
Utbildning					
Kort	24,2 (22,0-26,3)	29,9 (24,1-35,6)	32,8 (21,1-44,5)	32,0 (26,8-37,3)*	26,0 (24,2-27,9)
Mellanlång	12,4 (10,6-14,1)	12,4 (8,2-16,7)	16,1 (3,2-29,1)	17,4 (12,2-22,7)	12,7 (11,1-14,2)
Lång	8,5 (6,6-10,3)	11,1 (5,4-16,8)	4,8 (-4,3-13,9)	7,4 (1,7-13,1)	8,6 (6,9-10,2)
Göteborg Totalt	N=1058 16,4 (14,2-18,6)	N=226 20,8 (15,5-26,1)	-	N=180 19,4 (13,6-25,2)	18,1 (16,2-20,0)
Män	14,3 (11,2-17,4)	18,5 (15,4-21,6)	-	19,4 (12,4-26,4)	15,8 (13,1-18,5)
Kvinnor	18,1 (15,0-21,2)	23,4 (20,3-26,5)	-	19,5 (11,5-27,5)	20,5 (17,7-23,3)
16-29 år	6,3 (3,0-9,7)	25,9 (14,7-37,0)*	-	16,7 (7,2-26,1)	12,1 (8,6-15,7)
30-44 år	16,0 (11,9-20,1)	18,8 (10,2-27,3)	-	14,8 (5,3-24,3)	16,6 (13,1-20,1)
45-64 år	24,2 (19,8-28,6)	20,3 (10,5-30,1)	-	27,7 (14,9-40,4)	26,2 (22,2-30,1)
65-84 år	13,1 (8,3-17,8)	16,7 (1,8-31,6)	-	21,1 (3,6-38,5)	15,7 (11,1-20,3)
Utbildning					
Kort	20,7 (16,1-25,3)	21,7 (12,0-31,5)	-	24,1 (12,8-35,4)	21,0 (17,1-24,9)
Mellanlång	18,0 (14,6-21,3)	28,2 (19,5-36,8)	-	21,7 (12,9-30,5)	20,8 (17,8-23,8)
Lång	9,0 (5,6-12,3)	5,6 (-0,5-11,6)	-	9,3 (0,6-18,0)	9,4 (6,4-12,3)

⁸ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 16 b. Andel(procent) som **röker dagligen** vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, vid webbenkät och vid telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid webbenkät, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Stockholm 2006, totalt	N=3246 13,8 (12,6-15,0)	N=483 18,5 (15,1-21,9)*	N=299 16,9 (12,6-21,1)	N=728 13,3 (10,9-15,8)	N=341 20,0 (15,8-24,2)*	N=5097 15,5 (14,5-16,5)
Män	13,3 (11,5-15,1)	20,0 (14,9-25,1)	14,6 (8,5-20,8)	11,7 (8,7-14,8)	18,5 (13,2-23,9)	15,0 (13,6-16,4)
Kvinnor	14,1 (12,6-15,7)	17,1 (12,4-21,7)	18,6 (12,7-24,5)	15,8 (11,6-20,0)	22,0 (15,3-28,7)	16,0 (14,6-17,4)
18-29 år	15,2 (11,8-18,6)	25,0 (16,0-34,0)	11,9 (4,2-19,7)	11,6 (7,2-16,1)	20,6 (12,9-28,2)	15,9 (13,5-18,4)
30-44 år	9,9 (7,9-11,9)	13,1 (7,7-18,4)	15,0 (8,2-21,7)	12,6 (8,8-16,5)	15,0 (8,8-21,2)	12,5 (10,9-14,2)
45-64 år	17,6 (15,5-19,7)	20,2 (14,3-26,1)	25,6 (16,4-34,8)	15,8 (10,9-20,7)	9,7 (18,4-37,7)	19,8 (18,0-21,6)
65-84 år	10,8 (8,6-13,1)	17,9 (9,5-26,4)	9,7 (2,2-21,6)	14,3 (3,0-25,6)	12,0 (5,9-30,0)	12,0 (9,9-14,0)
Utbildning						
Kort	21,5 (19,1-23,9)	27,2 (20,8-33,6)	24,1 (16,2-32,0)	21,8 (16,2-27,5)	29,2 (22,2-36,2)	23,6 (21,6-25,5)
Mellanlång	11,6 (9,7-13,5)	18,2 (12,3-24,0)	18,4 (11,0-25,9)	10,1 (6,6-13,6)	13,6 (7,2-20,0)	12,9 (11,3-14,4)
Lång	7,6 (5,8-9,5)	5,2 (0,8-9,5)	5,4 (-0,5-11,3)	9,4 (5,4-13,4)	10,0 (2,4-17,6)	7,3 (5,8-8,8)

Dricker inte alkohol

Tabell 17a. Andel(procent) som *inte dricker alkohol* efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick, %	Efter andra, tredje ⁹ utskick, %	Efter fjärde utskick, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2176	N=2524		N=2626	N=2626
Totalt	60,0 (58,0-62,0)	58,9 (57,0-60,8)	-	58,4 (56,6-60,2)	57,5 (55,7-59,3)
Män	52,7 (49,7-55,7)	51,1 (48,3-53,9)	-	50,8 (48,1-53,5)	50,6 (47,9-53,3)
Kvinnor	66,3 (63,7-68,9)	66,0 (64,6-68,4)	-	65,4 (63,0-67,8)	65,2 (62,8-67,6)
16-29 år	66,2 (62,6-69,8)	63,9 (60,6-67,2)	-	63,5 (60,3-66,7)	63,8 (60,6-67,0)
30-44 år	60,5 (54,3-66,8)	56,9 (51,1-62,7)	-	55,3 (49,7-61,0)	58,4 (52,8-64,0)
45-64 år	48,0 (43,5-52,4)	48,5 (44,3-52,6)	-	48,3 (44,2-52,4)	48,2 (44,1-52,3)
65-84 år	77,5 (74,6-80,3)	76,6 (73,9-79,3)	-	76,3 (73,6-79,0)	78,1 (75,5-80,7)
Utbildning					
Kort	64,9 (62,1-67,7)	62,9 (60,2-65,5)	-	61,9 (59,4-64,5)	61,0 (58,4-63,6)
Mellanlång	53,5 (49,5-57,5)	51,9 (48,1-55,6)	-	51,7 (48,0-55,3)	52,1 (48,4-55,7)
Lång	39,3 (32,5-46,1)	41,7 (35,3-48,1)	-	41,8 (35,5-48,2)	47,4 (41,0-53,8)
Stockholm	N=4123	N=4756	N=4874	N=5514	
Totalt	10,3 (9,4-11,2)	11,0 (10,1-11,9)	11,1 (10,2-12,0)	11,9 (11,0-12,8)	13,2 (12,3-14,1)
Män	6,9 (5,7-8,1)	7,6 (6,5-8,7)	7,6 (6,5-8,7)	7,9 (6,8-9,0)	8,8 (7,7-9,9)
Kvinnor	13,1 (11,7-14,5)	13,9 (12,6-15,2)	14,1 (12,8-15,4)	15,3 (14,0-16,6)	17,5 (16,2-18,8)
18-29 år	9,6 (7,3-11,9)	9,5 (7,5-11,6)	9,8 (7,7-11,9)	10,6 (8,7-12,6)	12,2 (10,1-14,3)
30-44 år	8,1 (6,5-9,7)	8,9 (7,4-10,4)	9,0 (7,5-10,4)	9,5 (8,1-10,9)	10,9 (9,4-12,4)
45-64 år	7,8 (6,5-9,2)	8,7 (7,4-10,0)	8,9 (7,6-10,2)	9,1 (7,8-10,4)	10,7 (9,3-12,0)
65-84 år	19,0 (16,3-21,6)	20,1 (17,5-22,7)	20,3 (17,7-22,9)	22,6 (20,0-25,2)	24,8 (22,2-27,5)
Utbildning					
Kort	12,8 (11,2-14,5)	13,5 (12,0-15,1)	13,7 (12,2-15,3)	14,5 (13,0-15,9)	15,5 (14,0-17,0)
Mellanlång	6,8 (5,5-8,2)	7,6 (6,3-8,9)	7,6 (6,3-8,9)	7,8 (6,6-9,0)	8,4 (7,2-9,7)
Lång	6,4 (4,8-8,0)	6,5 (5,0-8,0)	6,7 (5,2-8,2)	6,7 (5,3-8,2)	6,8 (5,3-8,3)
Göteborg	N=1055	N=1280		N=1459	
Totalt	41,1 (38,1-44,1)	40,6 (37,9-43,3)	-	41,0 (38,5-43,5)	39,3 (36,8-41,8)
Män	31,8 (27,6-36,0)	31,5 (27,8-35,2)	-	32,2 (28,7-35,7)	30,7 (27,2-34,2)
Kvinnor	48,9 (44,8-53,0)	48,5 (44,8-52,2)	-	49,0 (45,5-52,5)	48,6 (45,1-52,1)
16-29 år	43,4 (36,6-50,2)	43,6 (37,6-49,5)	-	45,4 (40,0-50,8)	42,9 (37,5-48,2)
30-44 år	38,7 (33,2-44,1)	38,9 (34,0-43,8)	-	37,8 (33,3-42,4)	34,3 (29,9-38,7)
45-64 år	33,6 (28,8-38,5)	33,5 (29,0-38,0)	-	34,2 (29,9-38,4)	32,8 (28,6-37,0)
65-84 år	57,3 (50,3-64,3)	54,5 (47,9-61,2)	-	54,8 (48,5-61,1)	57,3 (51,0-63,6)
Utbildning					
Kort	59,2 (53,6-64,8)	57,0 (51,9-62,1)	-	57,1 (52,3-61,8)	55,8 (51,1-60,6)
Mellanlång	36,5 (32,3-40,8)	37,1 (33,2-41,0)	-	37,3 (33,7-41,0)	35,0 (31,4-38,5)
Lång	30,6 (25,2-36,0)	29,3 (24,4-34,2)	-	29,9 (25,3-34,6)	27,2 (22,7-31,6)

⁹ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 17b. Andel(procent) som *inte dricker alkohol* efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, efter webbenkät och efter telefonintervjun.

	Efter första utskick, %	Efter andra, tredje utskick, %	Efter fjärde utskick, %	Efter webbenkät, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, (%)
Stockholm 2006, totalt	N=3246 12,2 (11,1-13,4)	N=3729 13,1 (12,0-14,2)	N=4028 13,6 (12,5-14,6)	N=4756 12,7 (11,8-13,7)	N=5097 12,9 (11,9-13,8)	N=5097 13,4 (12,4-14,4)
Män	9,1 (7,5-10,6)	9,7 (8,3-11,2)	10,2 (8,7-11,6)	9,3 (8,1-10,5)	9,2 (8,1-10,4)	9,6 (8,4-10,8)
Kvinnor	14,5 (12,9-16,0)	15,6 (14,0-17,1)	16,1 (14,6-17,6)	15,5 (14,1-16,9)	15,9 (14,6-17,3)	17,3 (15,9-18,7)
18-29 år	12,1 (9,0-15,2)	14,1 (11,1-17,1)	14,6 (11,7-17,4)	13,4 (11,0-15,8)	12,9 (10,7-15,1)	13,5 (11,3-15,8)
30-44 år	9,6 (7,6-11,6)	10,5 (8,6-12,4)	11,4 (9,6-13,3)	10,5 (8,9-12,1)	10,8 (9,2-12,3)	11,2 (9,6-12,8)
45-64 år	10,5 (8,8-12,2)	11,2 (9,6-12,8)	11,1 (9,6-12,7)	10,6 (9,2-12,1)	10,7 (9,3-12,2)	11,7 (10,2-13,2)
65-84 år	18,4 (15,6-21,1)	19,2 (16,5-21,9)	20,1 (17,5-22,8)	19,8 (17,2-22,4)	20,4 (17,8-22,9)	22,0 (19,3-24,6)
Utbildning						
Kort	14,1 (12,1-16,1)	15,4 (13,4-17,3)	15,3 (13,4-17,1)	14,9 (13,2-16,7)	14,8 (13,1-16,4)	15,4 (13,8-17,1)
Mellanlång	8,5 (6,8-10,2)	9,4 (7,8-11,0)	10,4 (8,8-12,0)	9,5 (8,1-10,9)	9,5 (8,1-10,8)	9,7 (8,4-11,1)
Lång	8,2 (6,3-10,1)	8,7 (6,8-10,5)	8,9 (7,1-10,7)	8,3 (6,7-9,9)	8,5 (7,0-10,1)	8,2 (6,6-9,7)

Tabell 18a. Andel som *inte dricker alkohol* vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och i telefonintervjun.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje ¹⁰ utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2176	N=348		N=102	N=2626
Totalt	60,0 (58,0-62,0)	51,9 (46,7-57,1)*		45,8 (36,1-55,5)*	57,5 (55,7-59,3)
Män	52,7 (49,7-55,7)	42,7 (35,6-49,8)		45,5 (32,5-58,5)	50,6 (47,9-53,3)
Kvinnor	66,3 (63,7-68,9)	63,6 (56,4-70,8)		46,2 (31,8-60,6)*	65,2 (62,8-67,6)
16-29 år	66,2 (62,6-69,8)	52,8 (44,7-60,9)		57,1 (43,3-71,0)	63,8 (60,6-67,0)
30-44 år	60,5 (54,3-66,8)	39,1 (25,2-53,1)		29,4 (7,8-51,1)*	58,4 (52,8-64,0)
45-64 år	48,0 (43,5-52,4)	52,4 (40,1-64,6)		42,9 (16,9-68,8)	48,2 (44,1-52,3)
65-84 år	77,5 (74,6-80,3)	69,1 (60,1-78,2)		65,2 (45,8-84,7)	78,1 (75,5-80,7)
Utbildning					
Kort	64,9 (62,1-67,7)	51,5 (44,5-58,5)		42,7 (29,9-55,4)*	61,0 (58,4-63,6)
Mellanlång	53,5 (49,5-57,5)	39,6 (29,6-49,6)		45,7 (27,3-64,2)	52,1 (48,4-55,7)
Lång	39,3 (32,5-46,1)	58,4 (40,7-76,0)		50,0 (1,0-99,0)	47,4 (41,0-53,8)
Stockholm	N=4123	N=633	N=118	N=640	
Totalt	10,3 (9,4-11,2)	15,3 (12,5-18,1)*	17,0 (10,2-23,8)	17,3 (14,4-20,2)*	13,2 (12,3-14,1)
Män	6,9 (5,7-8,1)	11,2 (7,8-14,6)	9,2 (2,2-16,2)	9,5 (6,4-12,6)	8,8 (7,7-9,9)
Kvinnor	13,1 (11,7-14,5)	19,9 (15,4-24,4)*	26,4 (14,5-38,3)*	26,0 (21,1-30,9)*	17,5 (16,2-18,8)
18-29 år	9,6 (7,3-11,9)	9,4 (4,5-14,2)	15,6 (3,0-28,2)	14,5 (9,1-19,8)	12,2 (10,1-14,3)
30-44 år	8,1 (6,5-9,7)	13,2 (8,8-17,7)	9,8 (1,8-17,8)	12,7 (8,4-16,9)	10,9 (9,4-12,4)
45-64 år	7,8 (6,5-9,2)	15,3 (10,3-20,3)*	23,3 (8,2-38,5)	11,1 (6,1-16,1)	10,7 (9,3-12,0)
65-84 år	19,0 (16,3-21,6)	31,6 (21,6-41,7)*	60,0 (17,1-102,9)	44,6 (34,5-54,7)*	24,8 (22,2-27,5)
Utbildning					
Kort	12,8 (11,2-14,5)	18,2 (13,3-23,0)	19,7 (9,8-29,6)	18,9 (14,5-23,3)*	15,5 (14,0-17,0)
Mellanlång	6,8 (5,5-8,2)	12,2 (8,0-16,4)	10,0 (-0,6-20,6)	9,0 (5,1-13,0)	8,4 (7,2-9,7)
Lång	6,4 (4,8-8,0)	7,7 (2,9-12,5)	14,3 (-0,7-29,3)	7,5 (1,8-13,2)	6,8 (5,3-8,3)
Göteborg	N=1055	N=225		N=179	
Totalt	41,1 (38,1-44,1)	38,2 (31,8-44,6)	-	43,6 (36,3-50,9)	39,3 (36,8-41,8)
Män	31,8 (27,6-36,0)	30,5 (22,2-38,8)	-	36,1 (26,5-45,7)	30,7 (27,2-34,2)
Kvinnor	48,9 (44,8-53,0)	46,7 (37,2-56,2)	-	52,4 (41,6-63,2)	48,6 (45,1-52,1)
16-29 år	43,4 (36,6-50,2)	44,1 (31,4-56,7)	-	53,3 (40,7-66,0)	42,9 (37,5-48,2)
30-44 år	38,7 (33,2-44,1)	39,7 (29,0-50,5)	-	30,2 (17,9-42,4)	34,3 (29,9-38,7)
45-64 år	33,6 (28,8-38,5)	32,8 (21,4-44,2)	-	40,4 (26,4-54,5)	32,8 (28,6-37,0)
65-84 år	57,3 (50,3-64,3)	33,3 (14,5-52,2)	-	57,9 (36,8-79,0)	57,3 (51,0-63,6)
Utbildning					
Kort	59,2 (53,6-64,8)	47,8 (36,0-59,6)	-	57,4 (44,3-70,5)	55,8 (51,1-60,6)
Mellanlång	36,5 (32,3-40,8)	39,8 (30,4-49,2)	-	39,0 (28,6-49,5)	35,0 (31,4-38,5)
Lång	30,6 (25,2-36,0)	22,6 (11,6-33,7)	-	34,9 (20,6-49,1)	27,2 (22,7-31,6)

¹⁰ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 18b. Andel(procent) som **inte dricker alkohol** vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, vid webbenkät och vid telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid webbenkät, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Stockholm 2006, totalt	N=3246 12,2 (11,1-13,4)	N=483 19,0 (15,5-22,5)*	N=299 19,5 (15,0-24,0)*	N=728 8,0 (6,0-10,0)	N=341 14,5 (10,8-18,1)	N=5097 13,4 (12,4-14,4)
Män	9,1 (7,5-10,6)	13,5 (9,1-17,9)	15,4 (9,1-21,7)	6,0 (3,7-8,2)	8,3 (4,5-12,2)	9,6 (8,4-10,8)
Kvinnor	14,5 (12,9-16,0)	24,2 (18,8-29,6)*	22,7 (16,4-29,0)*	11,0 (7,4-14,7)	22,8 (16,0-29,6)*	17,3 (15,9-18,7)
18-29 år	12,1 (9,0-15,2)	23,9 (15,0-32,7)	17,9 (8,7-27,1)	10,1 (5,9-14,3)	9,3 (3,8-14,9)	13,5 (11,3-15,8)
30-44 år	9,6 (7,6-11,6)	15,2 (9,6-20,9)	20,4 (12,8-28,0)*	7,0 (4,1-10,0)	13,5 (7,6-19,4)	11,2 (9,6-12,8)
45-64 år	10,5 (8,8-12,2)	16,3 (10,9-21,7)	10,6 (4,1-17,1)	6,7 (3,3-10,1)	13,4 (6,1-20,7)	11,7 (10,2-13,2)
65-84 år	18,4 (15,6-21,1)	27,0 (17,2-36,8)	38,1 (23,6-52,6)	11,4 (1,2-21,7)	34,2 (19,3-49,1)	22,0 (19,3-24,6)
Utbildning						
Kort	14,1 (12,1-16,1)	23,5 (17,4-29,6)*	14,2 (7,7-20,6)	12,7 (8,1-17,2)	13,0 (7,9-18,2)	15,4 (13,8-17,1)
Mellanlång	8,5 (6,8-10,2)	15,2 (9,8-20,7)	22,1 (14,1-30,1)*	5,3 (2,7-7,9)	9,1 (3,7-14,5)	9,7 (8,4-11,1)
Lång	8,2 (6,3-10,1)	12,4 (5,9-18,8)	12,5 (3,8-21,2)	5,4 (2,4-8,5)	13,3 (4,7-21,9)	8,2 (6,6-9,7)

Trygghet och sociala relationer

Saknar emotionellt stöd

Tabell 19a. Andel(procent) som saknar emotionellt stöd efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick, %	Efter andra, tredje ¹¹ utskick, %	Efter fjärde utskick, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2184	N=2537		N=2635	N=2635
Totalt	10,5 (9,2-11,8)	10,3 (9,1-11,5)	-	10,4 (9,2-11,6)	11,3 (10,1-12,5)
Män	13,9 (11,8-16,0)	13,4 (11,5-15,3)	-	13,4 (11,5-15,3)	14,9 (13,0-16,8)
Kvinnor	7,5 (5,9-9,1)	7,5 (6,0-9,0)	-	7,5 (6,0-9,0)	7,3 (5,8-8,8)
16-29 år	8,6 (6,5-10,8)	9,0 (7,0-11,0)	-	9,3 (7,4-11,2)	12,2 (10,0-14,4)
30-44 år	7,3 (4,0-10,7)	6,9 (3,9-9,8)	-	7,1 (4,2-10,1)	5,1 (2,6-7,6)
45-64 år	11,7 (8,8-14,5)	11,2 (8,6-13,8)	-	11,1 (8,5-13,7)	13,4 (10,6-16,1)
65-84 år	12,7 (10,5-15,0)	13,0 (10,9-15,2)	-	13,2 (11,0-15,3)	14,6 (12,4-16,8)
Utbildning					
Kort	11,2 (9,3-13,0)	10,6 (9,0-12,3)	-	10,7 (9,0-12,3)	11,8 (10,1-13,5)
Mellanlång	8,2 (6,0-10,5)	8,5 (6,4-10,5)	-	8,5 (6,4-10,5)	9,9 (7,7-12,1)
Lång	8,9 (5,0-12,9)	8,6 (5,0-12,3)	-	9,1 (5,4-12,7)	10,4 (6,5-14,3)
Stockholm	N=4117	N=4740	N=4858	N=5496	
Totalt	10,8 (9,8-11,8)	10,9 (10,0-11,8)	10,8 (9,9-11,7)	10,3 (9,5-11,1)	10,7 (9,9-11,5)
Män	13,1 (11,5-14,7)	13,1 (11,7-14,5)	13,0 (11,6-14,4)	12,1 (10,8-13,4)	12,2 (10,9-13,5)
Kvinnor	9,0 (7,8-10,2)	9,0 (7,9-10,1)	8,9 (7,8-10,0)	8,8 (7,8-9,8)	9,3 (8,3-10,3)
18-29 år	6,1 (4,2-7,9)	6,3 (4,5-8,0)	6,0 (4,4-7,7)	5,2 (3,8-6,6)	5,6 (4,1-7,1)
30-44 år	9,0 (7,4-10,7)	9,5 (7,9-11,0)	9,4 (7,9-10,9)	9,4 (8,0-10,8)	10,3 (8,8-11,8)
45-64 år	11,6 (10,0-13,1)	11,6 (10,1-13,1)	11,6 (10,1-13,0)	11,1 (9,7-12,5)	12,0 (10,6-13,4)
65-84 år	15,5 (13,0-17,9)	15,4 (13,1-17,8)	15,5 (13,1-17,8)	15,4 (13,1-17,6)	16,3 (14,0-18,6)
Utbildning					
Kort	13,8 (12,1-15,5)	13,6 (12,0-15,2)	13,5 (12,0-15,0)	12,6 (11,2-14,0)	12,6 (11,2-14,0)
Mellanlång	8,9 (7,4-10,4)	9,4 (7,9-10,8)	9,3 (7,8-10,7)	8,8 (7,5-10,1)	9,6 (8,2-10,9)
Lång	7,5 (5,8-9,3)	7,6 (6,0-9,2)	7,5 (5,9-9,1)	7,4 (5,9-9,0)	7,3 (5,8-8,8)
Göteborg	N=1051	N=1277		N=1454	
Totalt	11,4 (9,5-13,3)	11,8 (10,0-13,6)	-	11,2 (9,6-12,8)	11,6 (10,0-13,2)
Män	15,0 (11,8-18,2)	15,2 (12,3-18,1)	-	14,7 (12,1-17,3)	15,1 (12,5-17,7)
Kvinnor	8,5 (6,2-10,8)	7,8 (5,7-9,9)	-	8,1 (6,2-10,0)	7,9 (6,0-9,8)
16-29 år	7,8 (4,1-11,4)	9,4 (5,9-13,0)	-	8,6 (5,6-11,7)	9,1 (6,0-12,2)
30-44 år	10,2 (6,8-13,6)	10,4 (7,4-13,5)	-	9,6 (6,9-12,4)	9,8 (7,0-12,6)
45-64 år	11,9 (8,6-15,2)	12,2 (9,1-15,3)	-	12,3 (9,3-15,2)	14,1 (11,0-17,2)
65-84 år	16,6 (11,3-21,8)	16,2 (11,3-21,1)	-	15,8 (11,2-20,5)	15,5 (10,9-20,1)
Utbildning					
Kort	16,2 (12,0-20,4)	15,3 (11,6-19,0)	-	15,3 (11,8-18,7)	14,5 (11,1-17,9)
Mellanlång	10,8 (8,1-13,6)	12,1 (9,5-14,8)	-	11,1 (8,8-13,5)	12,5 (10,0-15,0)
Lång	7,6 (4,5-10,7)	7,3 (4,5-10,0)	-	7,0 (4,4-9,5)	6,5 (4,0-9,0)

¹¹ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 19b. Andel(procent) som saknar emotionellt stöd efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, efter webbenkät och efter telefonintervju.

	Efter första utskick, %	Efter andra, tredje utskick, %	Efter fjärde utskick, %	Efter webbenkät, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, (%)
Stockholm 2006, totalt	N=3246 10,4 (9,3-11,4)	N=3729 10,8 (9,8-11,8)	N=4028 11,0 (10,0-12,0)	N=4756 11,0 (10,1-11,9)	N=5097 10,7 (9,9-11,6)	N=5097 11,2 (10,3-12,1)
Män	13,0 (11,2-14,8)	13,5 (11,8-15,2)	13,7 (12,0-15,3)	13,7 (12,2-15,2)	13,0 (11,6-14,4)	13,1 (11,7-14,5)
Kvinnor	8,5 (7,3-9,8)	8,9 (7,7-10,1)	9,1 (7,9-10,2)	8,8 (7,7-9,8)	8,8 (7,8-9,9)	9,3 (8,2-10,4)
18-29 år	7,3 (4,8-9,8)	8,2 (5,8-10,6)	8,1 (5,9-10,3)	8,4 (6,4-10,3)	7,5 (5,7-9,2)	8,0 (6,2-9,8)
30-44 år	9,1 (7,2-11,0)	10,2 (8,3-12,1)	10,8 (8,9-12,6)	10,6 (9,0-12,2)	10,5 (9,0-12,0)	11,9 (10,3-13,6)
45-64 år	12,4 (10,6-14,2)	12,8 (11,1-14,5)	12,9 (11,2-14,5)	13,1 (11,5-14,7)	12,9 (11,4-14,5)	12,9 (11,4-14,5)
65-84 år	9,7 (7,8-12,1)	9,8 (7,7-11,8)	9,9 (7,9-11,9)	9,6 (7,7-11,5)	9,9 (8,0-11,8)	10,4 (8,5-12,3)
Utbildning						
Kort	11,6 (9,8-13,5)	12,4 (10,6-14,2)	12,6 (10,9-14,3)	12,6 (11,0-14,2)	12,1 (10,6-13,6)	12,8 (11,3-14,3)
Mellanlång	9,8 (8,0-11,6)	10,7 (9,0-12,4)	11,0 (9,3-12,6)	11,0 (9,5-12,5)	10,7 (9,2-12,1)	11,0 (9,6-12,5)
Lång	9,5 (7,4-11,5)	9,4 (7,5-11,3)	9,4 (7,5-11,3)	9,3 (7,6-11,0)	9,2 (7,5-10,8)	9,4 (7,8-11,1)

Tabell 20a. Andel som saknar emotionellt stöd vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och i telefonintervjun.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje ¹² utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt kalibrerat, %
Norrland	N=2184	N=353		N=98	N=2635
Totalt	10,5 (9,2-11,8)	8,9 (5,7-12,1)		12,3 (5,6-19,0)	11,3 (10,1-12,5)
Män	13,9 (11,8-16,0)	10,2 (5,6-14,8)		14,7 (4,4-25,0)	14,9 (13,0-16,8)
Kvinnor	7,5 (5,9-9,1)	7,3 (2,9-11,7)		8,8 (n≤5)	7,3 (5,8-8,8)
16-29 år	8,6 (6,5-10,8)	10,6 (5,6-15,5)		14,8 (4,8-24,7)	12,2 (10,0-14,4)
30-44 år	7,3 (4,0-10,7)	4,4 (-1,4-10,3)		11,8 (-3,6-27,1)	5,1 (2,6-7,6)
45-64 år	11,7 (8,8-14,5)	7,8 (1,2-14,4)		7,1 (-6,3-20,6)	13,4 (10,6-16,1)
65-84 år	12,7 (10,5-15,0)	15,5 (8,4-22,6)		19,0 (3,0-35,1)	14,6 (12,4-16,8)
Utbildning					
Kort	11,2 (9,3-13,0)	7,5 (3,9-11,2)		11,8 (3,5-20,1)	11,8 (10,1-13,5)
Mellanlång	8,2 (6,0-10,5)	10,0 (3,9-16,2)		9,2 (-1,5-19,9)	9,9 (7,7-12,1)
Lång	8,9 (5,0-12,9)	6,6 (-2,3-15,5)		40,0 (-8,0-88,0)	10,4 (6,5-14,3)
Stockholm	N=4117	N=623	N=118	N=638	
Totalt	10,8 (9,8-11,8)	11,2 (8,7-13,7)	6,8 (2,3-11,3)	7,1 (5,1-9,1)*	10,7 (9,9-11,5)
Män	13,1 (11,5-14,7)	13,2 (9,5-16,9)	9,4 (2,3-16,5)	6,0 (3,5-8,5)*	12,2 (10,9-13,5)
Kvinnor	9,0 (7,8-10,2)	9,1 (5,8-12,4)	3,7 (n≤5)	8,3 (5,2-11,4)	9,3 (8,3-10,3)
18-29 år	6,1 (4,2-7,9)	7,2 (3,0-11,5)	0,0 (0,0-0,0)	5,2 (3,8-6,6)	5,6 (4,1-7,1)
30-44 år	9,0 (7,4-10,7)	11,7 (7,4-15,9)	7,8 (0,6-15,1)	9,4 (8,0-10,8)	10,3 (8,8-11,8)
45-64 år	11,6 (10,0-13,1)	11,9 (7,4-16,4)	10,0 (-0,7-20,7)	11,1 (9,7-12,5)	12,0 (10,6-13,4)
65-84 år	15,5 (13,0-17,9)	15,4 (7,6-23,1)	20,0 (-15,1-55,1)	15,4 (13,1-17,6)	16,3 (14,0-18,6)
Utbildning					
Kort	13,8 (12,1-15,5)	12,5 (8,4-16,6)	10,0 (2,5-17,5)	7,0 (4,1-9,8)*	12,6 (11,2-14,0)
Mellanlång	8,9 (7,4-10,4)	12,1 (7,9-16,3)	3,2 (-3,0-9,4)	5,0 (2,0-8,0)	9,6 (8,2-10,9)
Lång	7,5 (5,8-9,3)	8,0 (3,1-12,9)	4,8 (-4,3-13,9)	6,3 (1,0-11,5)	7,3 (5,8-8,8)
Göteborg	N=1051	N=226		N=177	
Totalt	11,4 (9,5-13,3)	13,3 (8,9-17,7)	-	7,3 (3,5-11,1)	11,6 (10,0-13,2)
Män	15,0 (11,8-18,2)	16,1 (9,5-22,7)	-	11,5 (5,1-17,9)	15,1 (12,5-17,7)
Kvinnor	8,5 (6,2-10,8)	10,2 (4,5-15,9)	-	2,5 (n≤5)	7,9 (6,0-9,8)
16-29 år	7,8 (4,1-11,4)	15,3 (6,1-24,4)	-	5,0 (-0,5-10,5)	9,1 (6,0-12,2)
30-44 år	10,2 (6,8-13,6)	11,3 (4,3-18,2)	-	3,8 (-1,3-8,9)	9,8 (7,0-12,6)
45-64 år	11,9 (8,6-15,2)	14,1 (5,6-22,5)	-	12,8 (3,2-22,3)	14,1 (11,0-17,2)
65-84 år	16,6 (11,3-21,8)	13,0 (-0,4-26,5)	-	11,8 (-2,0-25,5)	15,5 (10,9-20,1)
Utbildning					
Kort	16,2 (12,0-20,4)	11,6 (4,0-19,1)	-	15,1 (5,6-24,6)	14,5 (11,1-17,9)
Mellanlång	10,8 (8,1-13,6)	18,4 (11,0-25,9)	-	3,7 (-0,3-7,7)	12,5 (10,0-15,0)
Lång	7,6 (4,5-10,7)	5,6 (-0,5-11,6)	-	4,7 (-1,6-10,9)	6,5 (4,0-9,0)

¹² För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 20b. Andel(procent) som saknar emotionellt stöd vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick, vid webbenkät och vid telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid webbenkät, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Stockholm 2006, totalt	N=3246 10,4 (9,3-11,4)	N=483 14,1 (11,0-17,1)	N=299 13,1 (9,3-17,0)	N=728 10,8 (8,6-13,1)	N=341 7,5 (4,7-10,3)	N=5097 11,2 (10,3-12,1)
Män	13,0 (11,2-14,8)	16,3 (11,6-21,0)*	15,9 (9,4-22,3)	13,9 (10,6-17,2)	5,5 (2,3-8,7)*	13,1 (11,7-14,5)
Kvinnor	8,5 (7,3-9,8)	12,0 (7,9-16,0)	11,1 (6,4-15,9)	6,2 (3,4-9,0)	10,2 (5,3-15,2)	9,3 (8,2-10,4)
18-29 år	7,3 (4,8-9,8)	12,4 (5,5-19,2)	7,5 (1,2-13,8)	9,1 (5,1-13,1)	0,9 (-0,9-2,8)	8,0 (6,2-9,8)
30-44 år	9,1 (7,2-11,0)	16,3 (10,5-22,2)	16,0 (9,1-23,0)	9,9 (6,4-13,3)	9,7 (4,5-14,8)	11,9 (10,3-13,6)
45-64 år	12,4 (10,6-14,2)	15,6 (10,3-20,9)	14,3 (6,9-21,7)	15,0 (10,2-19,8)	8,6 (2,6-14,7)	12,9 (11,4-14,5)
65-84 år	9,7 (7,8-12,1)	7,9 (1,9-13,8)	12,5 (2,6-22,4)	3,0 (-2,5-8,6)	17,1 (5,3-29,0)	10,4 (8,5-12,3)
Utbildning						
Kort	11,6 (9,8-13,5)	17,3 (11,9-22,8)	14,7 (8,2-21,2)	12,7 (8,1-17,2)	7,0 (3,1-10,9)	12,8 (11,3-14,3)
Mellanlång	9,8 (8,0-11,6)	16,4 (10,7-22,0)	14,6 (7,8-21,3)	11,0 (7,3-14,6)	6,5 (1,9-11,2)	11,0 (9,6-12,5)
Lång	9,5 (7,4-11,5)	9,0 (3,4-14,6)	8,9 (1,5-16,4)	9,0 (5,1-12,8)	6,7 (0,4-13,0)	9,4 (7,8-11,1)

Litar inte på andra människor

Tabell 21. Andel (procent) som saknar tillit efter första utskick, andra utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick, %	Efter andra utskick, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2180	N=2527	N=2627	N=2627
Totalt	21,0 (19,3-22,7)	21,4 (19,8-23,0)	21,3 (19,7-22,9)	19,0 (17,4-20,6)
Män	21,5 (18,9-24,1)	22,0 (19,6-24,4)	21,7 (19,4-24,0)	19,6 (17,3-21,9)
Kvinnor	20,5 (18,1-22,9)	20,8 (18,6-23,0)	20,9 (18,7-23,1)	18,4 (16,2-20,6)
16-29 år	24,6 (21,4-27,9)	25,7 (22,7-28,7)	25,4 (22,5-28,3)	24,3 (21,4-27,1)
30-44 år	19,0 (13,9-24,0)	19,1 (14,5-23,7)	18,7 (14,3-23,1)	17,0 (12,7-21,2)
45-64 år	20,7 (17,2-24,3)	21,0 (17,6-24,4)	21,0 (17,7-24,3)	16,8 (13,8-19,9)
65-84 år	20,3 (17,5-23,0)	20,6 (18,0-23,2)	20,5 (18,0-23,1)	20,8 (18,2-23,3)
Utbildning				
Kort	26,2 (23,6-28,8)	26,0 (23,6-28,4)	25,5 (23,2-27,8)	21,9 (19,7-24,1)
Mellanlång	16,3 (13,3-19,2)	17,6 (14,7-20,5)	18,0 (15,1-20,8)	17,2 (14,4-19,9)
Lång	10,4 (6,2-14,7)	11,6 (7,5-15,8)	11,5 (7,4-15,6)	12,7 (8,4-17,0)
Göteborg	N=1053	N=1279	N=1455	
Totalt	22,5 (20,0-23,0)	24,3 (21,9-26,7)	24,3 (22,1-26,5)	25,8 (23,6-28,0)
Män	22,4 (18,7-26,1)	24,1 (20,7-27,5)	24,5 (21,3-27,7)	26,4 (23,2-29,6)
Kvinnor	22,6 (19,2-26,0)	24,5 (21,3-27,7)	24,2 (21,2-27,2)	25,2 (23,2-28,2)
16-29 år	27,7 (21,6-33,8)	30,9 (25,4-36,5)	30,8 (25,8-35,8)	31,5 (26,4-36,5)
30-44 år	24,3 (19,5-29,1)	24,9 (20,6-29,2)	24,4 (20,4-28,4)	26,0 (21,9-30,1)
45-64 år	21,4 (17,2-25,7)	23,2 (19,2-27,2)	23,6 (19,8-27,4)	25,5 (21,5-29,4)
65-84 år	15,8 (10,7-21,0)	17,0 (12,0-22,0)	16,2 (11,5-20,9)	15,3 (10,8-19,9)
Utbildning				
Kort	28,2 (23,0-33,3)	30,4 (25,7-35,1)	30,2 (25,8-34,6)	31,6 (27,2-36,1)
Mellanlång	24,7 (20,9-28,5)	26,6 (23,1-30,1)	26,2 (22,9-29,5)	27,5 (24,2-30,9)
Lång	12,9 (9,0-16,8)	13,8 (10,1-17,5)	14,6 (11,1-18,2)	15,6 (11,9-19,2)

Tabell 22. Andel som saknar tillit vid första utskick, andra utskick och i telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2180	N=347	N=100	N=2627
Totalt	21,0 (19,3-22,7)	24,2 (19,6-28,8)	17,8 (10,6-25,0)	19,0 (17,4-20,6)
Män	21,5 (18,9-24,1)	24,9 (18,3-31,2)	14,4 (6,0-22,8)	19,6 (17,3-21,9)
Kvinnor	20,5 (18,1-22,9)	23,3 (16,5-30,1)	22,9 (11,0-34,8)	18,4 (16,2-20,6)
16-29 år	24,6 (21,4-27,9)	30,6 (23,1-38,0)	21,0 (9,6-32,4)	24,3 (21,4-27,1)
30-44 år	19,0 (13,9-24,0)	20,0 (8,6-31,4)	11,8 (-3,6-27,1)	17,0 (12,7-21,2)
45-64 år	20,7 (17,2-24,3)	23,0 (12,6-33,3)	21,4 (-0,1-42,9)	16,8 (13,8-19,9)
65-84 år	20,3 (17,5-23,0)	23,4 (15,1-31,7)	18,2 (2,4-33,9)	20,8 (18,2-23,3)
Utbildning				
Kort	26,2 (23,6-28,8)	25,1 (19,0-31,1)	15,3 (6,0-24,5)	21,9 (19,7-24,1)
Mellanlång	16,2 (13,3-19,2)	27,8 (18,7-37,0)	27,6 (11,1-44,2)	17,2 (14,4-19,9)
Lång	10,4 (6,2-14,7)	19,8 (5,6-34,1)	0,0 (0,0-0,0)	12,7 (8,4-17,0)
Göteborg	N=1053	N=226	N=176	N=1455
Totalt	22,5 (20,0-23,0)	32,7 (26,6-38,8)*	24,4 (18,0-30,8)	25,8 (23,6-28,0)
Män	22,4 (18,7-26,1)	31,1 (22,3-39,4)	27,1 (18,2-36,0)	26,4 (23,2-29,6)
Kvinnor	22,6 (19,2-26,0)	34,6 (25,6-33,6)	21,3 (12,3-30,3)	25,2 (23,2-28,2)
16-29 år	27,7 (21,6-33,8)	42,4 (29,8-55,0)	30,0 (18,4-41,6)	31,5 (26,4-36,5)
30-44 år	24,3 (19,5-29,1)	27,5 (17,7-37,3)	20,8 (9,9-31,6)	26,0 (21,9-30,1)
45-64 år	21,4 (17,2-25,7)	32,8 (21,4-44,2)	27,7 (14,9-40,4)	25,5 (21,5-29,4)
65-84 år	15,8 (10,7-21,0)	26,1 (8,5-43,7)	10,4 (-4,1-16,6)	15,3 (10,8-19,9)
Utbildning				
Kort	28,2 (23,0-33,3)	39,7 (28,2-51,3)	28,8 (16,9-40,8)	31,6 (27,2-36,1)
Mellanlång	24,7 (20,9-28,5)	35,6 (26,4-44,8)	23,5 (14,4-32,5)	27,5 (24,2-30,9)
Lång	12,9 (9,0-16,8)	18,5 (8,3-28,8)	20,9 (8,8-33,1)	15,6 (11,9-19,2)

Ekonomiska resurser

Saknar kontantmarginal

Tabell 23. Andel(procent) som saknar kontantmarginal efter första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och efter telefonintervju.

	Efter första utskick, %	Efter andra, tredje ¹³ utskick, %	Efter fjärde utskick, %	Efter telefonintervju, %	Totalt, kalibrerat, %
Norrland	N=2191	N=2543		N=2643	N=2643
Totalt	12,2 (10,7-13,7)	13,0 (11,6-14,4)	-	12,7 (11,3-14,1)	14,1 (12,7-15,5)
Män	10,2 (8,2-12,2)	10,6 (8,8-12,4)	-	10,3 (8,5-12,1)	11,2 (9,4-13,0)
Kvinnor	14,0 (12,0-16,0)	15,1 (13,1-17,1)	-	14,9(12,9-16,9)	17,3 (15,3-19,3)
16-29 år	19,1 (16,1-22,1)	19,2 (16,5-21,9)	-	18,5 (15,9-21,1)	21,1 (18,4-23,8)
30-44 år	10,3 (6,4-14,2)	11,5 (7,7-15,2)	-	10,8 (7,3-14,3)	10,8 (7,3-14,3)
45-64 år	10,2 (7,5-12,9)	10,5 (8,0-13,1)	-	10,2 (7,8-12,7)	12,0 (9,3-14,6)
65-84 år	12,3 (10,1-14,5)	13,6 (11,4-15,8)	-	13,8 (11,7-16,0)	14,8 (12,6-17,1)
Utbildning					
Kort	11,2 (9,3-13,0)	10,6 (9,0-12,3)	-	10,7 (9,0-12,3)	16,1 (14,2-18,1)
Mellanlång	8,2 (6,0-10,5)	8,5 (6,4-10,5)	-	8,5 (6,4-10,5)	13,2 (10,7-15,7)
Lång	8,9 (5,0-12,9)	8,6 (5,0-12,3)	-	9,1 (5,4-12,7)	8,1 (4,6-11,5)
Stockholm	N=4136	N=4766	N=4884	N=5522	
Totalt	17,8 (16,6-19,0)	18,8 (17,7-19,9)	18,9 (17,8-20,0)	18,9 (17,9-19,9)	21,6 (20,6-22,6)
Män	13,9 (12,3-15,5)	15,0 (13,5-16,5)	15,1 (13,6-16,6)	14,6 (13,2-16,0)	17,5 (16,1-18,9)
Kvinnor	20,9 (19,2-22,6)	22,0 (20,4-23,6)	22,2 (20,6-23,8)	22,6 (21,1-24,1)	25,7 (24,2-27,2)
18-29 år	24,2 (20,8-27,6)	25,1 (22,0-28,2)	24,8 (21,8-27,8)	23,1 (20,4-25,7)	24,4 (21,6-27,1)
30-44 år	19,8 (17,5-22,1)	20,7 (18,6-22,9)	21,1 (19,0-23,2)	20,6 (18,6-22,5)	22,6 (20,6-24,7)
45-64 år	14,4 (12,7-16,2)	15,1 (13,5-16,8)	15,2 (13,6-16,9)	15,5 (13,9-17,1)	18,9 (17,1-20,6)
65-84 år	16,7 (14,1-19,2)	17,9 (15,4-20,3)	17,9 (15,4-20,4)	18,8 (16,4-21,2)	21,5 (18,9-24,0)
Utbildning					
Kort	25,4 (23,3-27,5)	26,2 (24,2-28,2)	26,2 (24,2-28,2)	25,5 (23,7-27,3)	27,1 (25,2-28,9)
Mellanlång	15,7 (13,7-17,6)	16,8 (14,9-18,6)	16,9 (15,1-18,8)	16,4 (14,7-18,1)	18,6 (16,8-20,4)
Lång	6,9 (5,3-8,6)	7,7 (6,1-9,3)	7,8 (6,2-9,5)	8,2 (6,6-9,8)	9,8 (8,1-11,6)
Göteborg	N=1059	N=1281		N=1458	
Totalt	23,5 (20,9-26,1)	24,8 (22,4-27,2)	-	23,6 (21,4-25,8)	23,5 (21,3-25,7)
Män	19,6 (16,0-23,2)	20,2 (17,0-23,4)	-	19,3 (16,4-22,2)	18,8 (15,9-21,7)
Kvinnor	26,8 (23,2-30,4)	28,8 (25,4-32,2)	-	27,5 (24,3-30,7)	28,7 (25,5-31,9)
16-29 år	24,3 (18,4-30,1)	28,7 (23,2-34,1)	-	26,8 (22,0-31,6)	25,0 (20,3-29,7)
30-44 år	24,6 (19,8-29,4)	25,1 (20,7-29,4)	-	23,4 (19,4-27,3)	23,5 (19,5-27,4)
45-64 år	23,8 (19,4-28,2)	23,6 (19,6-27,7)	-	22,4 (18,6-26,1)	22,8 (19,0-26,6)
65-84 år	20,4 (14,7-26,1)	22,0 (16,5-27,5)	-	22,0 (16,7-27,2)	22,5 (17,2-27,8)
Utbildning					
Kort	16,2 (12,0-20,4)	15,3 (11,6-19,0)	-	15,3 (11,8-18,7)	31,7 (27,2-36,1)
Mellanlång	10,8 (8,1-13,6)	12,1 (9,5-14,8)	-	11,1 (8,8-13,5)	24,1 (20,9-27,4)
Lång	7,6 (4,5-10,7)	7,3 (4,5-10,0)	-	7,0 (4,4-9,5)	12,6 (9,2-15,9)

¹³ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.

Tabell 24. Andel som saknar kontantmarginal vid första utskick, andra, tredje utskick, fjärde utskick och i telefonintervju.

	Vid första utskick, %	Vid andra, tredje ¹⁴ utskick, %	Vid fjärde utskick, %	Vid telefonintervju, %	Totalt kalibrerat, %
Norrland	N=2191	N=352		N=100	N=2643
Totalt	12,2 (10,7-13,7)	17,6 (13,5-21,7)		5,3 (-0,6-11,2)	14,1 (12,7-15,5)
Män	10,2 (8,2-12,2)	12,9 (7,9-17,9)		4,5 (n≤5)	11,2 (9,4-13,0)
Kvinnor	14,0 (12,0-16,0)	23,5 (16,8-30,2)*		6,5 (n≤5)	17,3 (15,3-19,3)
16-29 år	19,1 (16,1-22,1)	19,6 (13,1-26,0)		7,9 (0,4-15,5)*	21,1 (18,4-23,8)
30-44 år	10,3 (6,4-14,2)	17,4 (6,6-28,2)		0,0 (0,0-0,0)	10,8 (7,3-14,3)
45-64 år	10,2 (7,5-12,9)	12,9 (4,7-21,1)		0,0 (0,0-0,0)	12,0 (9,3-14,6)
65-84 år	12,3 (10,1-14,5)	24,5 (16,1-32,9)*		23,8 (6,4-41,2)	14,8 (12,6-17,1)
Utbildning					
Kort	14,6 (12,5-16,7)	20,6 (15,0-26,2)		4,1 (-1,0-9,2)	16,1 (14,2-18,1)
Mellanlång	10,1 (7,7-12,6)	11,3 (4,8-17,7)		3,6 (-3,3-10,5)	13,2 (10,7-15,7)
Lång	6,5 (3,1-9,9)	8,8 (-1,3-19,0)		0,0 (0,0-0,0)	8,1 (4,6-11,5)
Stockholm	N=4136	N=630	N=118	N=638	N=5522
Totalt	17,8 (16,6-19,0)	25,6 (22,2-29,0)*	23,7 (16,0-31,4)	18,5 (15,5-21,5)	21,6 (20,6-22,6)
Män	13,9 (12,3-15,5)	21,5 (17,1-25,9)*	15,4 (6,6-24,2)	11,9 (8,4-15,4)	17,5 (16,1-18,9)
Kvinnor	20,9 (19,2-22,6)	30,0 (24,8-35,2)*	34,0 (21,2-46,8)	25,9 (20,9-30,9)	25,7 (24,2-27,2)
18-29 år	24,2 (20,8-27,6)	29,3 (21,7-36,8)	16,1 (3,4-28,9)	15,1 (9,6-20,5)*	24,4 (21,6-27,1)
30-44 år	19,8 (17,5-22,1)	25,8 (20,0-31,6)	30,8 (18,3-43,2)	17,4 (12,5-22,3)	22,6 (20,6-24,7)
45-64 år	14,4 (12,7-16,2)	20,8 (15,2-26,5)	20,0 (5,7-34,3)	18,4 (12,3-24,6)	18,9 (17,1-20,6)
65-84 år	16,7 (14,1-19,2)	29,6 (19,8-39,5)*	20,0 (-15,1-55,1)	27,8 (18,7-36,9)	21,5 (18,9-24,0)
Utbildning					
Kort	25,4 (23,3-27,5)	31,3 (25,4-37,1)	26,2 (15,3-37,2)	21,5 (16,8-26,1)	27,1 (25,2-28,9)
Mellanlång	15,7 (13,7-17,6)	23,1 (17,8-28,5)*	26,7 (11,1-42,2)	12,5 (7,9-17,1)	18,6 (16,8-20,4)
Lång	6,9 (5,3-8,6)	13,7 (7,4-19,9)	14,3 (-0,7-29,3)	12,5 (5,3-19,7)	9,8 (8,1-11,6)
Göteborg	N=1059	N=222		N=177	N=1458
Totalt	23,5 (20,9-26,1)	31,1 (25,0-37,2)	-	14,7 (9,2-19,9)*	23,5 (21,3-25,7)
Män	19,6 (16,0-23,2)	22,9 (15,3-30,5)	-	13,4 (6,6-20,2)	18,8 (15,9-21,7)
Kvinnor	26,8 (23,2-30,4)	40,4 (31,0-49,8)*	-	16,3 (8,2-24,4)	28,7 (25,5-31,9)
16-29 år	24,3 (18,4-30,1)	44,1 (31,4-56,7)*	-	18,3 (8,5-28,1)	25,0 (20,3-29,7)
30-44 år	24,6 (19,8-29,4)	26,9 (17,2-36,6)	-	11,3 (2,9-19,8)	23,5 (19,5-27,4)
45-64 år	23,8 (19,4-28,2)	22,6 (12,4-32,7)	-	10,9 (2,0-19,8)	22,8 (19,0-26,6)
65-84 år	20,4 (14,7-26,1)	34,8 (15,7-53,8)	-	22,2 (4,4-40,0)	22,5 (17,2-27,8)
Utbildning					
Kort	30,9 (25,7-36,2)	43,3 (31,6-55,0)	-	26,4 (14,8-38,1)	31,7 (27,2-36,1)
Mellanlång	25,0 (21,2-28,8)	31,7 (22,7-40,6)	-	8,5 (2,6-14,5)*	24,1 (20,9-27,4)
Lång	13,2 (9,2-17,2)	14,8 (5,4-24,2)	-	11,9 (2,2-21,6)	12,6 (9,2-15,9)

¹⁴ För Stockholmsenkäten var det andra och tredje utskick.